Remoción de Cromo (VI) por una Cepa de *Aspergillus niger* Resistente a Cromato

Eduardo Rivera-Martínez⁽¹⁾, Juan F. Cárdenas-González⁽¹⁾, Víctor M. Martínez-Juárez⁽²⁾ e Ismael Acosta-Rodríguez⁽¹⁾

(1) Univ. Autónoma de San Luis Potosí, Fac. de Ciencias Químicas, Centro de Investigación y de Estudios de Posgrado, Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria, 78320 San Luis Potosí, S.L.P.- México

(2) Univ. Autónoma del Estado de Hidalgo Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Instituto de Ciencias Agropecuarias, Pachuca, México. (e-mail: iacosta@uaslp.mx)

Recibido Nov. 21, 2014; Aceptado Ene. 28, 2015; Versión final Feb. 10, 2015, Publicado Ago. 2015

Resumen

El objetivo de este trabajo fue analizar la capacidad de remoción de Cr (VI) por una cepa de *Aspergillus niger*, por el método colorimétrico de la difenilcarbazida. Cuando el hongo se incubó en medio mínimo con glucosa y otras fuentes de carbono comerciales y económicas, como azúcar no refinada o glicerol, en presencia de 50 mg/L de Cr (VI), removió totalmente el metal. Se produjo también Cr (III) en el medio de cultivo, después de 6 días de incubación a 28°C, pH de 5.3 y 6.2, agitación a una velocidad de 100 rpm y un inoculo de 8.3 mg de peso seco. Los resultados obtenidos indican que la cepa de *A. niger* tiene la capacidad de reducir Cr (VI) a Cr (III), y por lo tanto puede utilizarse para eliminar la contaminación por Cr (VI).

Palabras clave: remoción de cromo, resistencia, cromo (VI), biomasa fúngica, biorremediación

Chromium (VI) Removal by a Chromate-Resistant Strain of *Aspergillus niger*

Abstract

The objective of this work was to analyze the capability a fungal strain of *Aspergillus niger* to reduce chromium (VI), using the colorimetric method of diphenylcarbazide. When the strain was incubated in minimal medium with glucose and other inexpensive commercial carbon sources such as unrefined sugar or glycerol, in presence of 50 mg/L of Cr (VI), the strain completely removed Cr (VI). Also, Cr (III) was produced in the growth medium after 6 days of incubation, at 28°C, pH of 5.3 and 6.2, agitation speed of 100 rpm and an inoculum of 8.3 mg of dry weight. These results indicate that the fungal strain of *Aspergillus niger* has the capacity of reducing Cr (VI) to Cr (III), and therefore it can be used in for reducing Cr (VI) pollution.

Keywords: chromium removal, resistance, chromium VI, fungal biomass, bioremediation

INTRODUCCIÓN

La toxicidad del Cromo es una de las principales causas de contaminación ambiental, proveniente de las actividades industriales. Este metal se utiliza en el curtido de cuero y pieles, así como en las aleaciones del acero, galvanoplastia, tinción de textiles y biocida en los sistemas de enfriamiento de aguas en plantas nucleares, lo cual resulta invariablemente en las descargas del metal al medio ambiente con graves consecuencias (Ahemad, 2014). El Cromo existe en 9 estados de valencia con un rango de -2 a +6. De esos estados, únicamente el Cromo hexavalente [Cr (VI)] y el Cromo trivalente [Cr (III)] tienen importancia desde el punto de vista ambiental, pues son las formas de oxidación más estables en el medio ambiente (Smith, et. al., 2002).

Ambas formas, se encuentran en diferentes fuentes de agua, además de aguas residuales (Seng y Wang, 1994). El Cr (VI) se encuentra principalmente como cromato (CrO_4^{2-}) o dicromato ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$), dependiendo del pH de la solución (Seng y Wang, 1994). Ambos son muy solubles en agua y se absorben muy poco por el suelo y materia orgánica, por lo que son muy móviles en el suelo y agua (Smith, et. al., 2002), y representan un gran riesgo para la salud de animales y humanos, pues son muy tóxicos, mutagénicos, carcinogénicos y/o teratogénicos (Marsh y McInerney, 2001). En contraste, las formas de Cr (III), predominantemente hidróxidos, óxidos o sulfatos, son mucho menos solubles en agua, menos móviles, 100 veces menos tóxicas y 1 000 veces menos mutagénicas (Gutiérrez Corona, et. al., 2010).

Las principales técnicas para recuperar o remover Cr (VI) de aguas residuales son: reducción química y precipitación, adsorción sobre carbón activado, intercambio iónico y ósmosis inversa. Actualmente, el proceso más empleado es la reducción de Cr (VI) a Cr (III) por la adición de un agente reductor, seguido por su precipitación como $\text{Cr}(\text{OH})_3$ con una solución básica, usualmente cal en un medio básico (Park, et. al., 2005). Sin embargo, esos métodos tienen ciertas desventajas, como su alto costo, baja eficiencia, generación de residuos tóxicos u otros que requieren disposición y que implican complejidad operacional (Sahin y Öztürk, 2005). La capacidad de algunos organismos para interactuar con diferentes formas de Cromo, los hace muy atractivos en el contexto de la biotecnología ambiental. En este sentido, actualmente hay muchos reportes del uso de biomasa microbianas para la remoción de Cr (VI) de aguas residuales industriales y/o contaminadas (Gutiérrez Corona, et. al., 2010). Las propiedades de algunos microorganismos para tolerar y reducir Cr (VI) hacen posible su aplicación en procesos biotecnológicos enfocados a la destoxificación del mismo.

Por otro lado, se ha descrito la resistencia a Cr (VI) en bacterias y hongos aislados de ambientes contaminados con el mismo. Las levaduras aisladas incluyen a los género *Candida* y *Rhodospiridium*, aunque en éstas, el mecanismo general de resistencia a cromato está relacionado a la captura del ion, más bien que a una reducción química de las especies tóxicas (Bahafid, et. al., 2013; Pat, et. al., 2004). Sin embargo, otras levaduras como *Candida utilis* (Muter, et. al., 2001) y *Candida maltosa* (Ramírez-Ramírez, et. al., 2004), mostraron capacidad para reducir el Cr (VI), y la acumulación del mismo en la biomasa. Reportes recientes han analizado la captura y acumulación de Cr (VI) y Cr (III) por diferentes hongos filamentosos (Acevedo-Aguilar, et. al., 2008; Ahemad, 2014; Arévalo-Rangel, et. al., 2013; Coreño-Alonso, et. al., 2014; Vitti et. al., 2014). En este trabajo se estudia la remoción y/o reducción de Cr (VI) por una cepa de *Aspergillus niger* que presenta alta resistencia al mismo metal.

METODOLOGÍA

Se trabajó con una cepa de *A. niger* resistente a Cr (VI), aislada a partir del aire contaminado de una zona aledaña a la Facultad de Ciencias Químicas, de la UASLP, San Luis Potosí, S.L.P., México, la cual se mantuvo de manera rutinaria en Medio Mínimo de Lee modificado (LMM) conteniendo 1.0% de agar, 0.25% de KH_2PO_4 , 0.20% de MgSO_4 , 0.50% de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, 0.50% de NaCl y 0.25% de glucosa como fuente de carbono, y complementado con 500 mg/L de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

Para los experimentos relacionados con la remoción, se inocularon 5×10^5 esporas/mL, a 100 mL de LMM, complementados con 50 mg/L de Cr (VI) ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), y se incubaron a 28°C por 48 h. Después, y en condiciones estériles, las células se separaron por centrifugación a 2,000 rpm a 4°C durante 10 min, se lavaron 3 veces con agua tridesionizada para eliminar el medio de cultivo y restos celulares, se resuspendieron en 3 mL de agua tridesionizada estéril por agitación durante 30 s. en Vortex, y se transfirieron a 100 mL de LMM fresco complementado con 50 mg/L de Cr (VI). A diferentes tiempos, se tomaron alícuotas de 1 mL, las cuales se centrifugaron a 5,000 rpm por 10 min; el sobrenadante se utilizó para determinar la concentración de Cr (VI) y Cr (III) por los métodos espectrofotométricos de la Difenilcarbazida y Chromazurol S, respectivamente (Greenberg et. al., 1992; Pantaler y Pulyaeva, 1985) y el Cr total por Espectrofotometría de Absorción Atómica (Greenberg et. al., 1992). Todos los experimentos se realizaron mínimo 3 veces y por triplicado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra el efecto de diferentes pH's (4.0, 5.3, 6.2, mantenidos con regulador de citrato-fosfato 100 mMol/L) sobre la remoción de Cr (VI). La velocidad y porcentaje de remoción del metal, aumentan a medida que aumenta el pH. La máxima remoción se observó a pH de 5.3 y 6.2, (100% a los 6 días de incubación, a 28°C y 100 rpm). Sandana Mala et. al., (2006), reportaron una remoción máxima a una concentración de 100 mg/L de Cr (VI), usando *Aspergillus niger* MTCC 2594, con un pH óptimo de 5.0, Rodríguez et. al., (2008), a pH 3.0-5.0 para Pb^{+2} , Cd^{+2} y Cr^{+3} con la levadura *Saccharomyces cerevisiae*, y Fukuda et. al., (2008), a pH 3.0 también para Cr (VI) con el hongo *Penicillium* sp. En contraste a nuestras observaciones, Prasenjit y Sumathi (2005), reportaron una mayor remoción de Cr(VI) a pH 7.0 con el hongo *Aspergillus foetidus*, Al-Asheh y Duvnjak (1995), también demostraron un efecto positivo al aumentar el pH en un rango de 4.0 a 7.0 sobre la remoción de Cr (III) con *Aspergillus carbonarius*. Una baja en el pH causa la protonación de la superficie del adsorbente, lo que induce una fuerte atracción por los iones Cr (VI) de la solución cargados negativamente, por lo que la bioadsorción aumenta al aumentar la acidez de la solución. Pero cuando el pH aumenta, se incrementa la concentración de iones OH^- , induciendo cambios en la superficie del adsorbente, impidiendo la bioadsorción de los iones Cr (VI) cargados negativamente, lo cual disminuye la adsorción del metal a valores de pH altos (Gadd, 1981).

Fig. 1: Efecto del pH inicial sobre la remoción de Cr (VI) (50 mg/L) 100 rpm, 28°C.

Por otro lado, se analizó el efecto de la concentración de la biomasa celular sobre la capacidad de remoción de Cr (VI) en solución (Figura 2). A las concentraciones analizadas (8.3, 11.6 y 17.1 mg de peso seco), la capacidad de remoción fue similar (98.6%, 98.5% y 97.1%, respectivamente). En contraste a nuestras observaciones, la mayoría de los reportes en la literatura indican que a mayor cantidad de biomasa aumenta el porcentaje de remoción (Srivastava y Thakur, 2006; Morales-Barrera y Rodríguez et. al., 2008), pues a mayor cantidad de inoculo, hay más sitios de unión para acomplejar el metal (por ejemplo, los iones $HCrO_4^-$ y $Cr_2O_7^{2-}$) (Cervantes et. al., 2001). Como se observa en la Figura 3, cuando se incrementa la concentración inicial de Cr (VI) de 50 a 200 mg/L, disminuye el porcentaje de remoción del metal, lo cual puede deberse al incremento en el número de iones que compiten por los grupos funcionales disponibles en la superficie de la biomasa fúngica. Al respecto, Cárdenas-González et. al., (2011), reportan resultados parecidos con *Paecilomyces* sp, el cual remueve 50 mg/L a los 7 días de incubación, y cuando se incrementa a 200 mg/L remueve un 78%, también *Pichia jadinii* M9 y *Pichia anomala* M10 remueven 20 µg/L a las 12 y 8 horas, y 104 µg/L a las 104 y 72 horas respectivamente (Fernández et. al., 2012) y la bacteria resistente a Cr (VI) *Ochrobactrum intermedium* BCR400, la cual remueve eficientemente 50 mg/L, pero su eficiencia disminuye un 74.6%, cuando se aumenta la concentración del metal a 500 mg/L (Kavita y Keharia, 2012).

Las Figuras 4 y 5, muestran que la disminución en los niveles de Cr (VI) por el hongo en el medio de cultivo, ocurre exclusivamente en presencia de una fuente de carbono fermentable (glucosa, sacarosa, fructosa) u oxidable (glicerol). En presencia de glucosa, otras fuentes de carbono comerciales y económicas (azúcar moscabada y piloncillo o glicerol), la remoción de Cr (VI) es muy similar a los 7 días de incubación (100%, 86.5%, 100% y 90%, respectivamente), mientras que las otras fuentes de carbono analizadas fueron menos efectivas. La incubación de la biomasa en el medio de crecimiento sin fuentes de carbono, no produce cambios significativos en la concentración inicial del metal, lo cual indica que se requiere una fuente de carbono en el medio de cultivo para proporcionar el poder reductor necesario para disminuir la concentración de Cr (VI) en el medio de cultivo. Nuestras observaciones son parecidas a las reportadas por

Acevedo-Aguilar, et. al., (2008) y Coreño-Alonso et. al., (2009) con glucosa como fuente de carbono, pero son diferentes a las observaciones de Srivastava y Thakur (2006), con *Aspergillus* sp, quienes observaron que el acetato de sodio fue la fuente de carbono que indujo una mayor remoción del metal.

Fig. 2: Efecto de la concentración del preinoculo sobre la remoción de Cr (VI) (50 mg/L). pH 6.2, 28°C, 100 rpm.

Fig. 3: Efecto de la concentración de Cr (VI) sobre la remoción del mismo. pH 6.2, 28°C, 100 rpm.

Fig. 4: Efecto de diferentes fuentes de carbono sobre la remoción de 50 mg/L de Cr(VI). pH 6.2, 28 °C, 100 rpm.

Fig. 5: Efecto de diferentes fuentes de carbono comerciales + sal común sobre la remoción de 50 mg/L de Cr(VI). pH 6.2, 28°C, 100 rpm.

Debido a que la movilidad y toxicidad del Cromo dependen de su estado de oxidación, las reacciones redox que lo involucren son importantes para su destino en el ambiente y riesgo para la salud, se ha sugerido que su reducción en ambientes contaminados resulta de una interacción compleja de procesos bióticos y abióticos (Gutiérrez Corona et. al., 2010). Además, el Cr (VI) puede ser reducido a Cr (III) en el suelo por reacciones redox con especies inorgánicas acuosas, transferencia de electrones en superficies minerales, reacción con sustancias orgánicas no húmicas, (carbohidratos y proteínas), o reducción por sustancias húmicas del suelo (Palmer y Wittbrodt, 1991). También, la actividad microbiana puede contribuir a su reducción en estos ambientes contaminados, a través de la liberación del ion ferroso, sulfuros o intermediarios orgánicos reactivos (Buerge y Hug, 1998).

Por otra parte, se analizó la capacidad del hongo para disminuir el Cr (VI), con la producción de Cr (III) en el medio de cultivo. En la Tabla 1 se observa que después de 7 días de incubación, *A. niger* disminuye el 100% de la concentración del metal, con la producción concomitante de Cr (III), sin cambios significativos en los niveles de Cromo total en el medio de cultivo sin inoculo. Lo anterior indica que el hongo es capaz de reducir Cr (VI) a Cr (III) en el medio suplementado con cromato. Se han descrito dos mecanismos por los cuales el cromato puede ser reducido a un estado de oxidación menos tóxico, uno que involucra reacciones enzimáticas. Nosotros no sabemos si la cepa fúngica analizada expresa enzimas que reducen Cr (VI), por lo que se requieren más estudios para entender los efectos de los iones involucrados en dicha actividad reductora, aunque la capacidad de reducción se ha reportado en la literatura (Gutiérrez Corona et. al., 2010). El segundo mecanismo es la bioadsorción (Ahemad, 2014). La pared celular fúngica tiene diferentes grupos funcionales que pueden formar complejos de coordinación con los metales, lo que puede facilitar la remoción de los mismos en solución. Además, nuestras observaciones son similares a la mayoría de reportes de la literatura (Morales-Barrera y Cristiani-Urbina, 2008; Rodríguez et. al., 2008).

Tabla 1: Reducción de Cr (VI) y producción de Cr (III) por *A. niger*, en LMM complementado con 50 mg/L Cr(VI). 100 rpm. 28°C. pH 6.2

		Día 1	Día 7
Cr (VI) (mg/L)	Diphenilcarbazona	50	0
Cr (III)	Chromazurol S	0	49.6
Cr Total	Espectrofotometría de Absorción Atómica	50	49.8

También, se realizó un estudio de biorremediación, en el cual se inocularon 5×10^5 esporas/mL, a 100 mL de LMM (pH 5.3.) incubando a 28°C por 48 h a una agitación de 100 rpm; después se añadieron 20 g de tierra no estéril y 10 mL de agua, contaminados con 50 mg Cr(VI)/g de tierra, obtenidas de una tina de lavado de una cromadora de Celaya, Gto, México, a diferentes tiempos se tomaron alícuotas de 5 mL, y se centrifugaron a 5,000 rpm por 10 min; el sobrenadante se utilizó para determinar la concentración de Cr (VI), observando que después de 6 días de incubación, disminuye totalmente el metal en solución y un 70%, en las muestras de tierra y agua, respectivamente (Figura 6), sin cambios significativos en el contenido de

Cromo total. En un experimento realizado en ausencia de la cepa fúngica, la concentración de Cr (VI) de las muestras, disminuye aproximadamente un 18% en tierra y 7% en agua (datos no mostrados), lo cual puede ser causado por la microflora nativa y/o a componentes reductores presentes en las muestras contaminadas. La capacidad de remoción de Cr (VI) por el hongo, es igual o mejor a las de otras cepas reportadas, como *Candida maltosa* RR1 (Ramírez-Ramírez et., al.; 2004). Tal vez, esta cepa fue superior a las otras reportadas, debido a su capacidad de reducir eficientemente Cr (VI) bajo condiciones ácidas. La mayoría de estudios de reducción de Cr (VI) por microorganismos han sido realizados a pH neutro (Ramírez-Ramírez, et., al. 2004; Acevedo-Aguilar, et., al. 2008).

Los reportes sobre aplicaciones de microorganismos para estudios de biorremediación de suelos contaminados con cromato son escasos, como el empleo de bacterias no identificadas, nativas del sitio contaminado, encontrando que la reducción máxima de Cr (VI) ocurrió con el empleo de 15 mg de biomasa bacteriana/g de suelo (peso húmedo), con 50 mg de melasas/g de suelo como fuente de carbono; reduciendo completamente 5.6 mg Cr (VI)/g de suelo en 20 días (Jeyasingh y Philip, 2004). En otro estudio se utilizaron bacterias reductoras de Cr (VI) no identificadas, nativas de un sitio contaminado, encontrando que la reducción de 50 mg/L de Cr (VI) por las bacterias fue de alrededor de un 80%, con 10 g/L de peptona como fuente de electrones y un tiempo de retención hidráulica de 8 h. El Cr (III) producido fue removido utilizando una columna con el hongo *Ganoderma lucidum*, siendo la capacidad específica de adsorción de Cr (III) por el hongo en la columna de 576 mg/g (Krishna y Philip, 2005).

Fig. 6: Biorremediación de Cr(VI) a partir de tierra y agua contaminados (50 mg Cr(VI)/g tierra y/o 100 mL de agua). 28°C. pH 6.2 100 rpm.

CONCLUSIONES

La cepa analizada, removió completamente 50 mg/L de Cr (VI) en el medio de cultivo, a los 6 días de incubación, a 28°C, pH, 5.3 y 6.2, 100 rpm y un inoculo de 8.3 mg de peso seco. Además, si se aumenta la concentración del metal, disminuye el porcentaje de remoción, y el hongo, remueve totalmente el metal en solución y un 70%, en muestras de tierra y agua. Estos resultados sugieren la potencial aplicación de éste hongo para la biorremediación de sitios contaminados con Cr (VI).

REFERENCIAS

- Acevedo-Aguilar, F., A. y otros 7 autores, *Analytical speciation of chromium in in-vitro cultures of chromate-resistant filamentous fungi*, Analytical and Bioanalytical Chemistry: 392, 269-276 (2008)
- Al-Asheh, S. y Z. Duvnjak, *Adsorption of copper and chromium by Aspergillus carbonarius*, Biotechnology Progress: 11, 638-642, (1995)
- Ahemad, M. *Bacterial mechanisms for Cr(VI) resistance and reduction: an overview and recent advances*. Folia Microbiologica: 59, 321-332, (2014)
- Arévalo-Rangel. D.L., Cárdenas-González, J.F., Martínez-Juárez, V.M. y Acosta-Rodríguez, I. *Hexavalent Chromate Reductase Activity in Cell Free Extracts of Penicillium sp.* Bioinorganic Chemistry and Applications Volume 2013, Article ID 909412, 6 pages, (2013)

- Bahafid, W., y otros 4 autores, *Chromium Adsorption by Three Yeast Strains Isolated from Sediments in Morocco*. Geomicrobiology Journal: 30, 422–429, (2013)
- Buerge, I.J. y Hug, S.J. *Influence of organic ligands on chromium(VI) reduction by iron(II)*. Environmental Science and Technology: 32 (14), 2092- 2099 (1998)
- Cárdenas-González, J.F., Martínez-Juárez, V.M. y Acosta Rodríguez, I. *Remoción de Cromo (VI) por una Cepa de Paecilomyces sp Resistente a Cromato*, doi: 10.4067/S0718-0764201100040000, Información Tecnológica Vol. 22(4), 43-50 (2011)
- Coreño-Alonso, A., y otros 7 autores, *Cr(VI) reduction by an Aspergillus tubingensis strain: rol of carboxylic acids and implications for natural attenuation and biotreatment of Cr(VI) contamination*. Chemosphere: 76 (1), 43-47 (2009)
- Coreño-Alonso, A., y otros 7 autores, *Cr(VI) Mechanisms of interaction of chromium with Aspergillus niger var tubingensis strain Ed8*. Bioresource technology: 158, 188-192, (2014)
- Fernández, P.M., Martorell, M.M., Fariña, J.I. y Figueroa, L.I.C. *Removal Efficiency of Cr6+ by Indigenous Pichia sp. Isolated from Textile Factory Effluent*, doi:10.1100/2012/708213, The Scientific World Journal Volume 2012, Article ID 708213, 6 pages (2012)
- Fukuda, T. y otros 4 autores, *Cr(VI) reduction from contaminated soils by Aspergillus sp. N2 and Penicillium sp. N3 isolated from chromium deposits*, Journal of General Applied Microbiology: 54, 29 (2008)
- Gadd, G.M. *Accumulation of metals by microorganisms and algae*. In: Rhem H.J. Reed G. (eds) Biotechnology: a comprehensive treatise. Weinheim, Germany, Vol 6B, pp. 401-433. 5-303 (2008)
- Greenberg, A.E., L.S. Clesceri and A.D. Eaton, *Standard methods for the examination of water and wastewater*, 18ª ed. American Public Health Association, Washington, D.C. 3, pp. 58-3.60, 187-190, (1992)
- Gutiérrez Corona, J.F. y otros ocho autores, *Mecanismos de interacción con cromo y aplicaciones biotecnológicas en hongos*, Revista Latinoamericana de Biotecnología Ambiental y algal: 1(1), 47-63 (2010)
- Jeyasingh, J. y Philip, L. *Bioremediation of chromium contaminated soil: optimization of operating parameters under laboratory conditions*. Journal of Hazardous Materials: 118 (1-3), 113-120 (2005)
- Kavita, B. y Keharia, H. *Reduction of hexavalent chromium by Ocrobactrum intermedium BCR400 isolated from a chromium-contaminated soil*. Biotech: 2, 79-87 (20012)
- Krishna, K.R. y Philip, L. *Bioremediation of Cr(VI) in contaminated soils*. Journal of Hazardous Materials: 121(1-3) 109-117 (2005)
- Marsh, T.L. y M.J. McInerney, *Relationship of hydrogen bioavailability to chromate reduction in aquifer sediments*, Applied and Environmental Microbiology: 67, 1517-1521 (2001)
- Morales-Barrera, L. y E. Cristiani-Urbina, *Hexavalent Chromium Removal by a Trichoderma inhatum Fungal Strain Isolated from Tannery Effluent*, Water Air Soil Pollution: 187, 327-336 (2008)
- Muter, O., A. Patmalnieks, y A. Rapoport, *Interrelations of the yeast Candida utilis: metal reduction and its distribution in the cell and medium*, Process Biochemistry: 36, 963-970 (2001)
- Palmer, C.H. y P.R. Wittbrodt, *Processes affecting the remediation of chromium-contaminated sites*, Environmental Health Perspect: 92, 25-40 (1991)
- Pantaler, R.P. e I.V. Pulyaeva, *A spectrophotometric study of complexation between chromium and chromazurol S*. Journal of Analytical Chemistry: 40, 1634–1639 (1985)
- Park, D., Y. Yun, J. Jo y J.M., Park, *Mechanism of hexavalent chromium removal by dead fungal biomass of Aspergillus niger*, Water Research: 39, 533-540 (2005)
- Prasenjit B. y S. Sumathi, *Uptake of chromium by Aspergillus foetidus*, Journal of Materials Cycles waste Management: 7, 88-92 (2005)
- Ramírez-Ramírez, R. y otros seis autores, *Cr(VI) reduction in a Chromate-resistant strain of Candida maltose isolated from the leather industry*, Antonie van Leeuwenhoek: 85, 63-68 (2004)

Rodríguez, M.E., R.C. Miranda, R. Olivas y C.A. Sosa, *Efectos de las condiciones de operación sobre la biosorción de Pb^{++} , Cd^{++} and Cr^{+++} , en solución por *Saccharomyces cerevisiae* residual*, Información Tecnológica: 19, (6) 47-55 (2008)

Sandana Mala, J.G., B. Unni Nair, and R. Puvanakrishnan, *Bioaccumulation and biosorption of chromium by *Aspergillus niger* MTCC 2594*, Journal of General and Applied Microbiology: 52, 179-186 (2006)

Seng, H. y Y.T. Wang, *Biological reduction of chromium by *E. coli**, Journal of Environmental Engineering: 20, 560-572, (1994)

Smith, W.A., W.A. Apel, J.N. Petersen, y B.M. Peyton, *Effect of carbon and energy source on bacterial chromate reduction*, Bioremediation Journal: 6, 205-215 (2002)

Srivastava, S. y I.S. Thakur, *Isolation and process parameter optimization of *Aspergillus* sp. for removal of chromium from tannery effluent*, Bioresource Technology: 97, 1167-1173 (2006)

Vitti, C., Marchi, E., Decorosi, D. and Giovannetti, L. *Molecular mechanisms of Cr(VI) resistance in bacteria and fungi*. FEMS Microbiological Review: 38, 633–659, (2014)