ARTÍCULO ORIGINAL

Eficácia do piretróide sintético alfametrina no controle de Rhipicephalus sanguineus em cães

FLÁVIO B. SANT'ANNA¹, FABIANA O. TORRES¹, ISABELLA V. F. MARTINS¹, THAÍS R. CORREIA¹, JULIO I. FERNANDES², ISABEL F. DE FREITAS³, FÁBIO B. SCOTT⁴, e LAERTE GRISI⁵.

EFFICACY OF THE SYNTHETIC PYRETHROID ALPHAMETHRIN IN THE CONTROL OF *Rhipicephalus sanguineus* IN DOGS

*The objective of this study was to evaluate the efficacy of the synthetic pyrethroid alfamethrin in the control of **Rhipicephalus sanguineus** in dogs. In vitro tests with filter paper was done to nonengorged larvae, engorged larvae, nonengorged nymphs, engorged nymphs and nonengorged adults of **R. sanguineus**, given respectively a LC_{50} of 3,63; 4,79; 5,87; 10,01 and 11,19 ppm and a LC_{90} respectively of 13,17; 17,65; 29,37; 37,32 and 42,99 ppm. Different concentrations of alfamethrin was used in engorged females of **R. sanguineus** and the concentration of 300 ppm showed the most Reproductive Efficiency percentual (ER) (100%). In vivo tests in six dogs artificially infested with 500 nonengorged larvae, 100 nonengorged nymphs and 30 non engorged adults of **R. sanguineus**, given 86,2; 100 and 100% of mean efficacy respectively to larvae, nymphs and adults.*

Key words: Alfamethrin, *Rhipicephalus sanguineus*, Treatment and control.

INTRODUÇÃO

Rhipicephalus sanguineus é um ectoparasito causador de desconforto e espoliação em seus hospedeiros, além de ser um comprovado agente transmissor de diversos patógenos¹.

Para o tratamento e controle deste ectoparasito existem uma série de produtos químicos que apresentam eficácia comprovada, entre eles os organofosforados, as amidinas, os piretróides

sintéticos e os fenilpirazoles². Alfametrina é um acaricida do grupamento dos piretróides sintéticos, sendo desenvolvido inicialmente como produto ectoparasiticida para animais de produção, principalmente bovinos³, tendo como dose comercial a concentração de 50 ppm.

O objetivo deste trabalho foi o de determinar a eficácia *in vitro* e *in vivo* do piretróide sintético alfametrina no controle de *R. sanguineus* em cães.

¹ Aluno(a) de Pós-Graduação do CPGMV-PV, IV/UFRRJ. fbvet@bol.com.br

² Aluno de Graduação do Curso de Medicina Veterinária, IV/UFRRJ e bolsista do PIBIC/CNPq.

³ Aluna de Graduação de Medicina Veterinária, IV/UFRRJ.

⁴ Professor Adjunto do DPA/IV/UFRRJ.

⁵ Professor Titular do DPA/IV/UFRRJ.

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, BR-465, km 7. CEP: 23890-000.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Estudos Parasitocidas, do convênio Embrapa - Sanidade Animal/UFRRJ, Município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro. Fêmeas alimentadas de *R. sanguineus* naturalmente desprendidas de cães foram separadas em grupos de dez, pesados em balança analítica e transferidos para frascos contendo 50 ml da emulsão a ser testada durante três minutos⁴. Para o produto em teste e para o grupo controle foram empregados três repetições, sendo utilizadas as seguintes concentrações do produto em teste: 6,25; 12,5; 25; 50; 100; 200 e 300 ppm. O grupo controle foi imerso em água destilada. Após o banho de imersão cada repetição foi seca com papel toalha e acondicionadas em placas de petri, fixadas com fita dupla face e mantidas em câmara climatizada, tipo B.O.D., a 27° C (± 1) e umidade relativa de 80% (± 10), para posterior postura. Após o período de postura, a massa total de ovos de cada repetição foi pesado em balança analítica, transferidas para seringas descartáveis adaptadas com tampa de algodão e identificadas, sendo estas também acondicionadas em câmara climatizada, nas mesmas condições anteriores, com o objetivo de calcular a Eficiência Reprodutiva (E.R.)⁴, onde utilizou-se a seguinte fórmula: **ER= [(média de peso das massas de ovos (g)/média de peso das fêmeas alimentadas (g)) x (média do % eclosão) x 20.000].** O percentual de controle foi calculado com a seguinte fórmula: **% controle = [(ER_{CONTROLE} - ER_{TRATADO} / ER_{CONTROLE}) X 100]**. Para o ensaio *in vitro* envolvendo larvas não alimentadas, larvas alimentadas, ninfas não alimentadas, ninfas alimentadas e adultos não alimentados de *R. sanguineus* foram utilizadas respectivamente cinco diluições com três repetições de 100, 20, 20, 20 e 10 estádios. As diluições do produto foram de 1,5625; 3,125; 6,25; 12,5 e 25 ppm para larvas e ninfas não alimentadas e alimentadas e 3,125; 6,25; 12,5; 25 e 50 ppm para adultos não alimentados. Cada repetição foi acondicionada em envelopes de papel filtro (4,0 x 5,5 cm), imersos durante três minutos nas suas respectivas diluições e mantidas em temperatura ambiente durante 48

horas⁵, sendo as repetições do grupo controle imersas em água destilada. Após este prazo determinou-se a DL₅₀ e a DL₉₀ do produto em teste⁶. Para o ensaio *in vivo* envolvendo larvas, ninfas e adultos de *R. sanguineus* foram utilizados seis cães alocados individualmente em gaiolas. Dois dias antes do tratamento cada animal recebeu 500 larvas, 100 ninfas e 30 adultos. No dia do tratamento três animais foram tratados com o piretróide sintético alfamestrina na concentração de 50 ppm de princípio ativo e três foram mantidos como grupo controle, sendo banhados com água. O tratamento de cada animal foi efetuado com o auxílio de um pulverizador manual. Para o cálculo da eficácia do produto para larvas, ninfas e fêmeas de *R. sanguineus* empregou-se a seguinte fórmula: **% eficácia= [(número médio de estádios alimentados recuperados do grupo controle - número médio de estádios alimentados recuperados do grupo tratado) / (número médio de estádios alimentados recuperados do grupo controle) x 100]**.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os percentuais de controle da E.R. em fêmeas alimentadas de *R. sanguineus* para as diluições de 12,5; 25; 50; 100; 200 e 300 ppm, foram respectivamente de 21,7; 28,3; 27,1; 56,9; 77,0 e 100% (Tabela 1), sendo estes resultados inferiores a outros autores quando da utilização do piretróide sintético deltametrina a 25 ppm⁷.

Com relação ao ensaio *in vitro* envolvendo larvas não alimentadas, larvas alimentadas, ninfas não alimentadas, ninfas alimentadas e adultos não alimentados de *R. sanguineus*, foram obtidos respectivamente uma DL₅₀ de 3,63; 4,79; 5,87; 10,01 e 11,19 ppm e uma DL₉₀ respectivamente de 13,17; 17,65; 29,37; 37,32 e 42,99 ppm (Tabela 2), sendo estes resultados superiores a outros autores utilizando o piretróide sintético deltametrina a 25 ppm⁸ e permetrina a 150 ppm⁹. Com relação ao ensaio *in vivo*, foi obtido respectivamente um percentual médio de eficácia para larvas, ninfas e fêmeas de 86,2; 100 e 100% (Tabela 3), sendo estes resultados diferentes de outros autores quando da utilização dos piretróides sintéticos cipermetrina a 150 ppm e deltametrina

Tabela 1. Atividade *in vitro* do piretróide sintético alfamestrina em fêmeas alimentadas de *Rhipicephalus sanguineus*

Diluição (ppm)	Média das fêmeas alimentadas (g)	Média de Peso Postura (g)	Percentual médio	Eficiência Reprodutiva	Percentual controle
Controle	1,27	0,42	84%	555.590,54	-
12,5	1,25	0,34	80%	435.200	21,7%
25	1,265	0,365	69%	398.181,8	28,3%
50	1,24	0,375	67%	405.241,92	27,1%
100	1,25	0,22	68%	239.360	56,9%
200	1,245	0,135	59%	127.951,8	77%
300	1,27	0	0%	0	100%

Tabela 2. Slope, DL₅₀ (ppm), DL₉₀ (ppm) e intervalo de confiança (95%) do piretróide sintético alfamestrina sobre larvas, ninfas e adultos não alimentados e larvas e ninfas alimentadas de *Rhipicephalus sanguineus*

Estádios evolutivos	Slope	DL ₅₀ (ppm)	IC 95% ^a	DL ₉₀ (ppm)	IC 95% ^a
não alimentados					
Larvas	2,29	3,63	3,19 – 4,13	13,17	10,78 – 18,04
Ninfas	1,83	5,87	4,26 – 8,09	29,37	15,40 – 80,97
Adultos	2,19	11,19	7,53 – 16,63	42,99	21,10 – 131,54
alimentados					
Larvas	2,26	4,79	3,63 – 6,32	17,65	11,02 – 36,99
ninfas	2,24	10,01	7,49 – 13,37	37,32	20,83 – 93,33

^a 95% Intervalo de Confiança

Tabela 3. Avaliação da eficácia do piretróide sintético alfamestrina na concentração de 50 ppm, no controle de larvas, ninfas e adultos de *Rhipicephalus sanguineus*, através de infestação artificial

Identificação dos animais	Larvas alimentadas recuperadas	Ninfas alimentadas recuperadas	Fêmeas alimentadas recuperadas
Grupo controle			
G1	11	05	04
G2	09	05	04
G3	09	03	02
Total	29	13	10
Média	9,67	4,33	3,33
Grupo tratado			
G4	03	0	0
G5	01	0	0
G6	0	0	0
Total	04	0	0
Média	1,33	0	0
Eficácia (%)	86,2	100	100

a 25 ppm¹⁰ e semelhantes a outro trabalho quando da utilização do piretróide sintético deltametrina a 0,07% na forma de shampoo¹¹.

O piretróide sintético alfamestrina foi eficaz no controle de fêmeas alimentadas de *Rhipicephalus sanguineus* na concentração de 300 ppm e demonstrou ser eficaz, *in vitro*, no controle de larvas não alimentadas, larvas alimentadas, ninfas não alimentadas, ninfas alimentadas e adultos não alimentados de *R. sanguineus* respectivamente nas concentrações de 13,17; 17,65; 29,37; 37,32 e 42,99 ppm.

Larvas e ninfas não alimentadas de *R. sanguineus* foram mais susceptíveis à ação do produto em teste quando comparados com larvas e ninfas alimentadas de *R. sanguineus*.

O produto em teste demonstrou ser eficaz *in vivo* no controle de larvas, ninfas e adultos do carrapato *R. sanguineus* quando empregado na concentração de 50 ppm.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi o de avaliar a eficácia do piretróide sintético alfamestrina no controle de *Rhipicephalus sanguineus* em cães. Testes *in vitro*, utilizando papéis de filtro, foram efetuados para larvas não alimentadas, larvas alimentadas, ninfas não alimentadas, ninfas alimentadas e adultos não alimentados de *R. sanguineus*, obtendo-se respectivamente uma DL₅₀ de 3,63; 4,79; 5,87; 10,01 e 11,19 ppm e uma DL₉₀ de 13,17; 17,65; 29,37; 37,32 e 42,99 ppm. Diferentes concentrações de alfamestrina foram utilizadas para fêmeas alimentadas de *R. sanguineus*, sendo a concentração de 300 ppm que apresentou um maior percentual de Eficácia reprodutiva (ER) (100%). Para o teste *in vivo* com *R. sanguineus*, seis cães foram artificialmente infestados com 500 larvas, 100 ninfas e 30 adultos não alimentados cada animal, apresentando respectivamente para larvas, ninfas e fêmeas alimentadas de *R. sanguineus* uma eficácia média de 86,2; 100 e 100%.

REFERÊNCIAS

- 1.- KELLY J D. *Canine Parasitology*, Ed. Univ. Sydney, 1a Ed. 1977, 112p.
- 2.- LABRUNA M B, PEREIRA M P. Carrapato em cães no Brasil. *Clínica Vet* 2001; 30: 24-32.
- 3.- GRISI L, ROCHA A M. Characterization of alphasmethrin as a new tickicide for use in cattle in Brazil. Conference of World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 11th, Rio de Janeiro, Brazil, 1985, Abstracts.
- 4.- DRUMMOND R O, GLADNEY W J, WHETSTONE T M, ERNEST S E. Laboratory testing of insecticides for control of winter tick. *J Econ Ent* 1971; 64: 686-8.
- 5.- GLADNEY W J, DAWKINS C C, DRUMMOND R O. Insecticides tested for control of Nymphal brown dog ticks by the «Tea Bag» Technique. *J Econ Ent* 1972; 65: 174-6.
- 6.- RUSSELL R M, ROBERTSON J C, SEVIN V E. Polo: A new computer program for probit analysis. *Bull Entomol Soc Am* 1977; 25: 203-4.
- 7.- SANT'ANNA F B, SCOTT F B, COUMENDOUROS K. Avaliação da atividade carrapaticida *in vitro* do amitraz, DDVP, coumaphos e deltametrina sobre teleóginas de *Rhipicephalus sanguineus*. Anais do XI Seminário de Parasitologia Veterinária, Salvador, Bahia, 1999; p.95.
- 8.- SANT'ANNA F B, SCOTT F B, COUMENDOUROS K et al. Avaliação da eficácia carrapaticida do amitraz, coumaphos e deltametrina sobre larvas e ninfas não ingurgitadas de *Rhipicephalus sanguineus*. Anais XI Seminário de Parasitologia Veterinária, Salvador, Bahia, 1999; p. 95.
- 9.- KOCH H G, BURKWHAT H E. Susceptibility of the brown dog tick (ACARI: IXODIDAE) to fresh residues of Acaricides: Laboratory assays and comparison of susceptibility of different life stages of the Lone Star and American Dog Tick. *J Econ Ent* 1984; 77: 670-4.
- 10.- BICALHO K A, FERREIRA F, BORGES L M F, RIBEIRO M F B. Evaluation of the effects of some acaricides on life stages of *Rhipicephalus sanguineus* (ACARI: IXODIDAE). Anais do XI Seminário de Parasitologia Veterinária, Salvador, Bahia, 1999; p. 97.
- 11.- FRANC M, CADIERGUES M C. Activity of a deltamethrin shampoo against *Ctenocephalides felis* and *Rhipicephalus sanguineus* in dogs. *Vet Parasitol* 1999; 81: 341-6