RECIDIVA QUISTE HIDÁTICO HEPÁTICO COMPLICADO CON FISTULIZACIÓN BILIAR*

Drs. Gabriela Espinosa N.¹, Patricia López P.¹, Luis Ruso M.¹

¹ Clínica Quirúrgica 3, Hospital Maciel, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.

Relapse hepatic hydatid cyst complicated with bile fistula

Mujer, 39 años, operada de hidatidosis hepática en la adolescencia. Ingresa por dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre.

Tomografía abdominal: Quiste multivesicular de 10 x 14 x 12 cm contactando con hilio hepático y vena cava inferior, en segmentos II- III- IV. Vía biliar dilatada (Figura 1).

Hallazgos intraoperatorios: Hígado normal. Quiste hidático abierto y evacuado en conducto

biliar izquierdo. Múltiples vesículas hijas. Gruesa adventicia hidática, calcificada (Figuras 2 y 3).

Táctica quirúrgica: Coledocotomía, extracción de vesículas con desconexión quistobiliar con tubo de Kehr. Quistoadventicectomía casi total dejando sólo la adventicia en contacto con la vena cava e hilio hepático.

Buena evolución postoperatoria con alta a los 20 días de hospital.

Figura 1. Corte sagital tomográfico que evidencia el quiste hidático en íntimo contacto con la vena cava inferior.

*Recibido el 16 de septiembre de 2013 y aceptado para publicación el 17 de octubre de 2013.

Correspondencia: Dra. Gabriela Espinosa N.
gabrielaespinosa@msn.com

Figura 2. Imágenes del intraoperatorio que muestran vesículas hijas rodeadas de gruesa adventicia del quiste.

Figura 3. Vesículas hijas en líquido hidatídico.

Referencias

1. Perdomo R, Balboa O, Morelli R, Melognio S. Quistes hidáticos del hígado abiertos en las vías biliares. Desconexión quistobiliar por coledocostomía transhepatocóquística. *Cir Uruguay* 1976;46:33-9.
2. Perdomo R, Morelli R, Carriquiry L, Chifflet J, Bergalli L. Cholédocostomie trans-hépatocystique en cas de kyste hydatique ouvert dans les voies biliaires. *Nouv Presse Med.* 1977;6:747-49.
3. Marella M. Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones biliares de la hidatidosis. *Cir Uruguay* 1973;43:498-505.
4. Ruso L, Balboa O, Fernández R, Alvarez O, Díaz F, de Simone G. Destrucción del confluente biliar superior de causa hidática. Manejo quirúrgico. *Cir Uruguay* 2005;75:150-4.