Factores pronósticos de sobrevida alejada en cáncer gástrico. Introducción del nuevo índice N+/T

Manuel Figueroa-Giralt¹

Trabajo de Ingreso a la Sociedad de Cirujanos de Chile

Prognostic factors of long term survival in gastric cancer. Introduction of the new N+/T index

Background: The identification of survival prognostic factors for gastric cancer, allows us to create clinical guidelines. Chile has a deficit in the analysis of long-term survival prognostic factors. **Aim:** To assess different prognostic factors of long-term survival in gastric cancer. Determine the survival rate at 5 and 10-years post gastrectomy, and the value of a new prognostic factor of long-term survival called N+/T. **Material and Method:** Prospective study of the oncological database of the Clinical Hospital of the University of Chile between May 2004 and May 2012. **Results:** A total of 284 patients were included, 65.4% were men and the mean age was 64.5 years. Seventy-five percent were advanced gastric cancer, 72.5% of the patients required a total gastrectomy. The lymphadenectomy practiced was D2 in 85.2%, and average lymph node harvest was 30 lymph nodes. The postoperative morbidity and mortality was 17.2% and 1.7% respectively. The average global survival was 69.9 months, the 5-year survival was 56.9% and the 10-year survival was 53.4%. The N+/T index presented a statistically significant difference in the global survival of all the subgroups ($p < 0.0001$). The multivariate analysis showed that the significant variables were: N+/T index ($p = 0.0001$, OR: 1.1 [1.05-1.12]), LNR ($p = 0.0001$, OR: 5.8 [1.04-15.6]), age ($p = 0.008$, OR: 1.03 [1.00-1.06]), lymphovascular permeation ($p = 0.0001$, OR: 2.19 [1.49-3.23]), T classification ($p = 0.03$, OR: 3.4 [1.10-8.93]), N classification ($p = 0.001$, OR: 1.06 [1.02-1.10]), and TNM stage ($p = 0.004$, OR: 1.03 [1.01-1.06]). The areas under the ROC curves of the N+/T, LNR and T classification, were 0.789, 0.786 and 0.790 respectively ($p = 0.96$). **Conclusion:** The independent prognostic factors of long-term survival were N+/T index, LNR, age, lymphovascular permeation, T classification, N classification and TNM stage. Concomitantly, a new prognostic factor has been created to assess survival in gastric cancer, the N+/T index.

Key words: gastric cancer; survival; prognosis; index.

Resumen

Introducción: La identificación de factores pronósticos del cáncer gástrico, ha permitido predecir la evolución de los pacientes y así tomar decisiones terapéuticas. En Chile existe un déficit en el análisis de factores pronósticos de sobrevida alejada. **Objetivos:** Los objetivos de este estudio fueron: evaluar distintos factores pronósticos de sobrevida alejada en cáncer gástrico, determinar la tasa de sobrevida global mayor a 5 y 10 años posoperatoria tanto en cánceres incipientes como avanzados y evaluar el valor de un nuevo factor pronóstico de sobrevida alejada denominado N+/T. **Material y Método:** Estudio prospectivo de la base de datos oncológica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre mayo de 2004 y mayo de 2012. **Resultados:** Se incluyeron un total de 284 pacientes, 65,4% fueron hombres, la edad media fue 64,5 años. 75% de la muestra fueron cánceres avanzados, 72,5% de los pacientes requirieron una gastrectomía total. La linfadenectomía practicada fue D2 en un 85,2%. La cosecha linfonodal global media fueron 30 linfonodos. La morbilidad y mortalidad quirúrgica posoperatoria fue de 17,2% y 1,7% respectivamente. La sobrevida global media fue de 69,9 meses, la sobrevida a 5 años fue de 56,9% y la sobrevida a 10 años fue de 53,4%. Al analizar el índice N+/T, se identifica una diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida global alejada de todos los subgrupos ($p < 0,0001$). El análisis multivariado de los factores

¹Departamento de Cirugía
Hospital Clínico de la
Universidad de Chile.
Santiago, Chile.

Recibido el 6 de noviembre
de 2017 y aceptado para
publicación el 4 de diciembre
de 2017.

Correspondencia a:
Dr. Manuel Figueroa-Giralt
manuelfigueroa.gi@gmail.
com

ARTÍCULO ORIGINAL

pronósticos objetiva que las variables significativas son: índice N+/T ($p = 0,0001$, OR: 1,1 [1,05-1,12]), LNR ($p = 0,0001$, OR: 5,8 [1,04-15,6]), edad ($p = 0,008$, OR: 1,03 [1,00-1,06]), permeación linfovascular ($p = 0,0001$, OR: 2,19 [1,49-3,23]), clasificación T ($p = 0,03$, OR: 3,4 [1,10-8,93]), clasificación N ($p = 0,001$, OR: 1,06 [1,02-1,10]) y estadio TNM ($p = 0,004$, OR: 1,03 [1,01-1,06]). Las curvas ROC del índice N+/T, LNR y clasificación T poseen áreas bajo la curva de 0,789, 0,786 y 0,790 respectivamente, sin diferencia estadística significativa ($p = 0,96$). **Conclusión:** Los factores pronósticos independientes de sobrevida mayor a 5 años son: índice N+/T, LNR, edad, permeación linfovascular, clasificación T, clasificación N y estadio TNM. Concomitantemente se ha logrado aportar un nuevo cuociente pronóstico en la evaluación de pacientes con adenocarcinoma gástrico resecados con intención curativa, el índice N+/T. **Palabras clave:** cáncer gástrico; sobrevida; pronóstico; índice.

Introducción

El cáncer gástrico en Chile ha experimentado un significativo cambio en cuanto a tratamiento y pronóstico en los últimos 40 años. Es así como se ha presenciado un aumento de pacientes con cánceres indiferenciados (en especial el tipo anillo en sello), tumores de tercio superior del estómago, una mayor proporción de gastrectomías totales, junto con una significativa disminución de mortalidad quirúrgica y mejora en sobrevida global a 5 años (SVg5)¹⁻⁴.

La identificación de algunos factores pronósticos ha permitido predecir qué pacientes tendrán una peor evolución y así contribuir en la toma de decisiones terapéuticas⁵. Sin embargo, en nuestra realidad nacional existe un déficit de estudios que analicen factores pronósticos de sobrevida alejada.⁶ El objetivo principal de este estudio fue evaluar distintos factores pronósticos de sobrevida alejada en cáncer gástrico. Los objetivos secundarios son: a) describir las características demográficas de la población estudiada, b) analizar la evolución posoperatoria de los pacientes, c) determinar la tasa de sobrevida global mayor a 5 y 10 años posoperatoria y d) evaluar el valor de un nuevo factor pronóstico de sobrevida alejada denominado N+/T.

Material y Método

Este trabajo es un análisis prospectivo de la base de datos oncológica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El período de análisis fue entre mayo de 2004 y mayo de 2012, con el objeto de tener un seguimiento mayor a 5 años en todos los pacientes vivos de ese período de tiempo.

Pacientes estudiados

En el presente estudio se incluyeron todos los pacientes con adenocarcinoma gástrico y de unión

gastroesofágica Siewert II y III en población adulta, tratados en forma quirúrgica con intención curativa. Se incluyeron gastrectomías subtotales, totales y ampliadas. Estas últimas se definieron como aquellas gastrectomías que incluyeron resección adicional de otro órgano para alcanzar el R0, como esófago intratorácico, colon, páncreas y riñón.

Técnica quirúrgica

Las cirugías realizadas fueron gastrectomías subtotales en caso de lesiones distales sin células en anillo de sello, o gastrectomías totales en caso de tener un carcinoma de tipo intestinal del tercio medio o proximal o un carcinoma difuso de cualquier localización. Se obtuvo un margen distal a 2 cm del píloro y el margen proximal a 4 cm en caso de lesiones incipientes y 6 cm en caso de lesiones avanzadas, lo que corresponde a una cirugía R0. En todos los pacientes se realizó biopsia contemporánea intraoperatoria para confirmar bordes de sección libres de compromiso tumoral. La linfadenectomía fue D2, excepto en casos de lesiones incipientes donde se realizó D1 alfa o beta. La omentectomía mayor y menor fue de regla en casos de lesiones avanzadas, mientras que en casos de lesiones incipientes se realizaron omentectomías parciales a 6 cm de arcada gastromental. En las lesiones de cara posterior con compromiso de serosa se realizó bursectomía. La esplenectomía se llevó a cabo en caso de compromiso linfonodal del grupo 10 o ante invasión tumoral esplénica. En caso de lesiones con compromiso de órganos adyacentes por contigüidad (no metastásico) se realizó una gastrectomía ampliada para alcanzar R0.

Definiciones

- La clasificación TNM y el estadio final, se estandarizó empleando la 7ª ed. de la AJCC para todos los pacientes.

- T** Tx: no se puede evaluar el tumor primario.
 T0: sin evidencia de tumor primario en el estómago.
 Tis: cáncer *in situ*.
 T1a: tumor se extiende hasta la mucosa.
 T1b: tumor se extiende hasta la submucosa.
 T2: tumor se extiende hasta la muscular propia.
 T3: tumor se extiende hasta la subserosa.
 T4a: tumor compromete la serosa gástrica.
 T4b: tumor compromete órganos que rodean el estómago.
- N** Nx: no se puede evaluar el compromiso linfonodal.
 N0: sin compromiso linfonodal.
 N1: compromiso oncológico histológico de 1-2 linfonodos.
 N2: compromiso oncológico histológico de 3-6 linfonodos.
 N3a: compromiso oncológico histológico de 7-15 linfonodos.
 N3b: compromiso oncológico histológico de 16 o más linfonodos.
- M** Mx: metástasis no evaluables.
 M0: sin metástasis viscerales ni peritoneales.
 M1: presencia de metástasis viscerales y/o peritoneales.

Estadios

Los estadios se clasificaron según la combinación de los distintos factores del TNM de la siguiente manera, siguiendo la 7ª ed. de la AJCC.

- 0: TisN0M0.
 IA: T1N0M0.
 IB: T2N0M0, T1N1M0.
 IIA: T3N0M0, T2N1M0, T1N2M0.
 IIB: T4aN0M0, T3N1M0, T2N2M0, T1N3M0.
 IIIA: T4aN1M0, T3N2M0, T2N3M0.
 IIIB: T4bN0M0, T4bN1M0, T4aN2M0, T3N3M0.
 IIIC: T4bN2M0, T4bN3M0, T4aN3M0.
 IV: Cualquier T, Cualquier N, M1.

- b) El índice linfonodal (LNR) definido como el cociente entre el número de linfonodos comprometido por metástasis histológica y el número total de linfonodos cosechados (expresado en porcentaje), se subdividió en 0: 0% de linfonodos comprometidos, 1: de 1% a 9% de linfonodos comprometidos, 2: de 10 a 25% de linfonodos comprometidos y 3: más de 25% de linfonodos comprometidos⁷.
- c) El índice N+/T calcula el cociente entre el número de linfonodos positivos para metástasis de adenocarcinoma y la clasificación T del paciente.

Para fines matemáticos las subdivisiones de T1a y T1b se asumieron indistintamente como 1 en el denominador (ejemplos: $1/T1a = 1/1 = 1$, $6/T3 = 6/3 = 2$, $24/T4 = 24/4 = 6$). Los resultados de la razón se dividieron en subgrupos N+/T A (0), N+/T B (0,1-3) y N+/T C (> 3).

- d) La mortalidad quirúrgica se definió desde el momento de la cirugía hasta 30 días posoperatorios.
 e) La sobrevida global se definió desde el alta hospitalaria, eliminando la mortalidad quirúrgica.
 f) La sobrevida alejada se definió como aquella mayor a 5 años posoperatorios.
 g) El tiempo cero para determinar asociación pronóstica fue la gastrectomía.
 h) Las comorbilidades fueron definidas a partir de las guías ministeriales chilenas MINSAL⁸⁻¹¹.

Cálculos estadísticos

Los factores pronósticos evaluados fueron demográficos (sexo, edad, clasificación ASA, comorbilidades), clínicos (síntomas, exámenes de laboratorio), quirúrgicos (tipo de gastrectomía, morbilidad quirúrgica, morbilidad médica), anatomopatológicos (presencia de células en anillo de sello, permeación linfovascular, compromiso perineural, clasificación TNM y estadios de dicha clasificación), e índices pronósticos (índice linfonodal e índice N+/T).

La distribución de las variables se determinó por *test* de Shapirowilk. De acuerdo a este, las variables continuas con distribución paramétrica (ordinal) se expresan en promedio y desviación estándar (DS), mientras que en las variables continuas con distribución no paramétricas (nominal) se empleó mediana y rango intercuartil (IC_{25%-75%}). Las variables categóricas fueron descritas en porcentajes. Se utilizó *test* de Fisher, χ^2 , *t* de student y Wilcoxon Rank-Sum según característica y distribución de las variables. Para el análisis estadístico analítico se empleó el programa Stata^R 14, se consideró estadísticamente significativo un $p < 0,05$, se realizaron análisis uni y multivariado de los factores pronósticos calculando el odds ratio (OR) con un intervalo de confianza (IC) de 95%. Para las curvas de sobrevida se empleó el método de Kaplan-Meier en el programa Prism^{7MR}. En la creación de curvas ROC se empleó el programa Stata^R 14.

Seguimiento

Considerando los criterios de exclusión, el presente estudio posee un 100% de seguimiento. El llenado de la base de datos se realiza en forma prospectiva con cada paciente, mientras que la actualización de la sobrevida se lleva a cabo en forma anual

ARTÍCULO ORIGINAL

(mes de febrero), con la base de datos de nuestro hospital y del Registro Civil de Chile.

Resultados

Se incluyeron un total de 284 pacientes, de los cuales un 65,4% fueron hombres, la edad media fue 64,5 años ($\pm 12,7$ DS). Un 69,7% de los pacientes presentaron comorbilidades siendo la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes las más frecuentes, con un 38,3%, 34,8% y 17,6% respectivamente (Tabla 1). Según la clasificación ASA¹², un 21,1% fueron ASA I, 70,7% fueron ASA II y 8,0% fueron ASA III. Un 24,6% de los pacientes presentaban familiares de primer grado con cáncer gástrico.

Tabla 1. Comorbilidades de la población global de pacientes (n: 284)

	n	%
Pacientes con comorbilidades	198	69,7
HTA	109	38,3
Tabaquismo	99	34,8
DM2	50	17,6
DLP	21	7,1
IAM	16	5,4
Hipotiroidismo	7	2,4
ACV	4	1,3
ICC	2	0,7
Valvulopatías	2	0,7

HTA: Hipertensión arterial, DM2: Diabetes mellitus 2, DLP: Dislipidemia, IAM: Infarto agudo al miocardio, ACV: Accidente cerebrovascular, ICC: Insuficiencia cardíaca congestiva.

Figura 1. Órganos adicionales resecados en las gastrectomías ampliadas (n: 22).

En relación a la forma clínica de presentación un 55,9% presentaron epigastralgia, 10,5% disfagia y 10,1% saciedad precoz. La baja de peso se identificó en un 45,7% con una mediana de pérdida de 8 kg (2-35 kg). La anemia (HTO < 35%) estuvo presente en un 30,9%, mientras que la desnutrición proteica (albúmina < 3,5 mg/dl) en un 12,6%.

Respecto a la técnica quirúrgica, 72,5% de los pacientes requirieron una gastrectomía total, 19,7% un subtotal y 7,8% una gastrectomía ampliada. El detalle de los órganos extraídos adicionalmente se detalla en la Figura 1. La linfadenectomía practicada fue un D1 alfa o beta en un 14,7% y un D2 en un 85,2%. La cosecha linfonodal global media fueron 30 linfonodos (IC_{25-75%}: 22-41). El número de los ganglios cosechados en linfadenectomías D1 (alfa y beta) corresponde a 28 (IC_{25-75%}: 19-32,5), mientras que en D2 es 33 (IC_{25-75%}: 24-44). El tiempo operatorio promedio fue de 208 min ($\pm 63,8$ DS). El 100% de la muestra fueron resecciones R0.

La estadía hospitalaria media de los pacientes fue de 9 días (IC_{25-75%}: 7-11). La morbilidad quirúrgica posoperatoria correspondió a 17,2%, mientras que la mortalidad quirúrgica fue de 5 pacientes (atribuidas a 3 filtraciones de esofagoyeyuno anastomosis, 1 neumonía asociada a ventilación mecánica y una fístula de muñón duodenal) lo que representa un 1,7% (Tabla 2).

El estudio histopatológico identificó que un 58,4% de los tumores fueron de tipo intestinal,

Tabla 2. Morbilidad y mortalidad posoperatoria (n: 284)

	n	%
1. Mortalidad		
Operatoria hasta los 30 días	5	1,7
2. Morbilidad quirúrgica		
Colección intraabdominal	24	8,4
Fístula EY	23	8
Fístula de muñón duodenal	10	3,5
Infección herida operatoria	8	2,8
Obstrucción intestinal	7	2,4
Hemoperitoneo	4	1,4
Fístula pancreática tipo A	1	0,3
3. Morbilidad médica		
Respiratorias	22	7,7
Cardiovasculares	13	4,5
Infecciosas médicas	16	5,6

SDRA: Síndrome de distrés respiratorio del adulto, TEP: Tromboembolismo pulmonar, ITU: infección del tracto urinario, ICC: insuficiencia cardíaca congestiva, IAM: infarto agudo de miocardio.

mientras que el 36,6% son de tipo difuso (indiferenciados o con células en anillo de sello) y un 4,9% fueron mixtos. Un 25% de la muestra corresponde a cánceres incipientes y un 75% a avanzados. Los pacientes con células en anillo de sello representan un 24,2% de la muestra total. La permeación linfovascular se identificó en un 50,3% de la muestra, mientras que el compromiso perineural en un 41,5%. La media de linfonodos comprometidos por paciente fue 2 (IC_{25-75%}: 0-9) y la media del índice ganglionar de toda la muestra fue 7% (IC_{25-75%}: 0-31,2), lo que corresponde a una clasificación de LNR 1. Las Tablas 3 y 4 muestran la clasificación TNM y estadio de los pacientes.

La sobrevida global media fue de 69,9 meses (intervalo entre 1 y 158 meses, con DS ± 47,9). La tasa de pacientes con una SVg5 fue de 56,9%, de este grupo un 40,2% fueron cánceres incipientes y un 59,8% avanzados, la SVg5 de estos fue 90,1% y 44,6% respectivamente. Las curvas de sobrevida según clasificación T y N se detallan en la Figura 2, ambas gráficas muestran diferencias estadísticamente significativas entre grupos con un p < 0,0001 para cada una.

La sobrevida global mayor a 10 años de la población que completó el seguimiento entre 2004 hasta 2007 (133 pacientes), fue de 53,4%, este tipo de sobrevida en cánceres incipientes (27,1% de dicha cohorte) fue 88,8%, mientras que en cánceres avanzados (72,9% de dicha cohorte) fue 40,2%.

Al comparar la evolución de la sobrevida entre pacientes con más y menos de 5 años de supervivencia, se objetiva que, dentro del grupo de pacientes con sobrevida exclusivamente menor a 5 años, un 50,7% fallece antes de los 2 años, mientras que la población de pacientes con sobrevida exclusivamen-

Tabla 3. Clasificación T y N (n: 284)

	n	%
Clasificación T		
T1	71	25
T2	31	10,9
T3	73	25,7
T4	109	38,3
Clasificación N		
N0	114	40,1
N1	33	11,6
N2	39	13,7
N3a	55	19,3
N3b	43	15,1

Clasificación TNM según la 7ª ed. de la AJCC de 2010.

Tabla 4. Estadios TNM (n: 284)

Estadio	n	%
IA	67	23
IB	14	4,9
IIA	27	9,5
IIB	34	11,9
IIIA	31	10,9
IIIB	51	17,9
IIIC	60	21,1

Clasificación por estadio según la 7ª ed. de la AJCC de 2010.

te mayor a 5 años presenta sólo una caída de 17,2% entre el 5º y 10º año posoperatorio (Figura 3).

La sobrevida global según el índice linfonal de nuestra población estudiada se refleja en la Figura 4.

Figura 2. Curvas de sobrevida global según clasificación T y N. A) Sobrevida según T y B) Sobrevida según N. SVg%: porcentaje de sobrevida global.

ARTÍCULO ORIGINAL

Figura 3. Curvas de supervivencia global diferenciando paciente con supervivencia global mayor y menor a 5 años. SVg > 5 años: supervivencia global mayor a 5 años, SVg < 5 años: supervivencia global menor a 5 años, SVg%: porcentaje de supervivencia global. *50,7% de los pacientes con supervivencia menor a 5 años fallece antes de los 24 meses. **Supervivencia a 10 años del grupo de pacientes con supervivencia mayor de 5 años entre 2004 y 2007.

La diferencia observada alcanza una significancia estadística con un $p < 0,0001$.

Al analizar el índice N+/T, se identifica una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia global alejada de todos los subgrupos (N+/T A, N+/T B y N+/T C) con un $p < 0,0001$ (Figura 5).

Al realizar el estudio comparativo univariado entre pacientes con menos o más de 5 años de supervivencia global, se obtienen los resultados expuestos en la Tabla 5. En este tipo de análisis, el índice N+/T logra discriminar ambos grupos de manera estadísticamente significativa en cada una de sus divisiones (N+/T A, N+/T B y N+/T C). Los pacientes N+/T A presentan un $p < 0,0001$. OR: 0,12 (IC 95%: 0,07-0,21)], mientras que los pacientes N+/T C presentan un $p < 0,0001$. OR: 6,45 (IC 95%: 3,42-12,09)]. (Tabla 4).

Figura 4. Curvas de supervivencia global alejada según grupos de LNR. SVg%: porcentaje de supervivencia global.

Figura 5. Curvas de supervivencia global alejada según grupos de índice N+/T. SVg%: porcentaje de supervivencia global.

Tabla 5. Análisis univariado de factores pronóstico de supervivencia alejada (n: 279*)

Variable	SVg < 5 años		SVg > 5 años		Análisis univariado	
	n 120	%	n 159	%	p	OR (IC 95%)
Sexo						
Hombres	89	73,7	94	59,1	0,018	1,98 (1,1-3,3)
Mujeres	31	26,2	65	40,8		
Edad						
Análisis como variable continua**	63,5		60,8		0,002	1,02 (1,00-1,04)
ASA						
I	23	19,4	37	23	0,4	
II-III	97	80,5	122	76,7		
Comorbilidades						
Tabaquismo	53	44,9	76	47,7	0,6	3,00 (1,4-6,0)
HTA	48	39,8	57	35,8	0,5	
DM2	27	22	14	8,8	0,001	

Continúa

Continuación Tabla 5

Variable	SVg < 5 años		SVg > 5 años		Análisis univariado	
	n 120	%	n 159	%	p	OR (IC 95%)
Clínica						
Epigastralgia	61	50,8	98	61,6	0,08	
Llene precoz	15	11,8	6	3,7	0,01	3,64 (1,3-9,3)
Disfagia	18	15,2	11	6,9	0,046	2,37 (1,0-5,1)
Laboratorio						
HTO < 35%	35	29,6	49	30,8	0,7	
Albúmina < 3,5 mg/dl	14	11,8	19	11,9	> 0,9	
Quirúrgico						
Gastrectomía subtotal	16	13,5	39	24,5	0,02	0,47 (0,2-0,8)
Gastrectomía total	96	79,6	106	66,6		
Gastrectomía ampliada	8	6,7	14	8,8		
Morbilidad quirúrgica						
Fístula anastomótica	10	8,4	13	8,1	> 0,9	
Fístula duodenal	6	5	5	3,1	0,5	
Colección intraabdominal	11	9,3	13	8,7	0,8	
Morbilidad médicas						
Neumonía	5	2,5	3	1,8	0,2	
Arritmia	1	0,8	7	4,4	0,1	
Histología						
Células anillo de sello	41	34,7	29	18,2	0,003	2,2 (1,3-3,9)
Permeación linfovascular	83	68,6	59	37,1	< 0,0001	3,8 (2,2-6,3)
Compromiso perineural	71	59,3	43	27	0,0005	2,5 (1,5-4,3)
T						
1	7	5,9	64	40,2	< 0,0001	0,09 (0,03-0,21)
2	19	16,1	21	13,2		
3	33	27,9	37	23,2		
4	70	57,6	37	23,2		
N						
0	16	12,7	97	61	< 0,0001	0,09 (0,05-0,18)
1	12	10,1	20	12,5		
2	20	16,1	19	11,9		
3	72	61	23	14,4		
Estadio						
IA	5	4,2	62	38,8	< 0,0001	0,1 (0,06-0,18)
IB	4	3,3	10	6,2		
IIA	3	2,5	23	14,4		
IIB	14	11	20	12,5		
IIIA	13	11	17	10,6		
IIIB	36	29,6	13	8,1		
IIIC	45	38,1	14	8,8		
Índice linfonodal						
LNR 0 (0%)	16	12,7	97	61	< 0,0001	0,08 (0,04-0,16)
LNR 1 (1-9%)	14	11,8	22	13,8		
LNR 2 (10-25%)	25	21,1	25	15,7		
LNR 3 (> 25%)	65	54,2	15	9,4		
Índice N+/T						
A (0)	20	16,1	97	61	< 0,0001	0,12 (0,07-0,23)
B (0,1-3)	52	43,2	48	30,1		
C (> 3)	48	40,6	14	8,8		

IC: Intervalo de confianza, OR: *Odds ratio*, SVg > 5 años: sobrevida global mayor a 5 años, SVg < 5 años: sobrevida global menor a 5 años. *Se excluyeron los 5 pacientes que presentaron mortalidad quirúrgica, **El análisis de edad se realizó considerándola como variable continua, las edades expresadas en las columnas son los promedios de edad de los pacientes con menos y más de 5 años de sobrevida.

ARTÍCULO ORIGINAL

El análisis multivariado de los factores pronósticos está representado en la Tabla 6, donde se evidencia que las variables que persisten siendo significativas son: índice N+/T, LNR, edad, permeación linfovascular, clasificación T, clasificación N y estadio TNM.

La curva ROC del índice N+/T y las curvas comparativas entre las variables predictoras T y LNR se representa en la Figura 6. El área bajo la curva de N+/T es 0,789 y la diferencia apreciada entre las curvas de las tres variables comparadas no alcanza una significancia estadística, con un $p = 0,96$.

Tabla 6. Análisis multivariado de factores pronóstico de sobrevida alejada

Variable	Análisis multivariado	
	p	OR (IC 95%)
Edad	0,008	1,03 (1,00-1,06)
Célula anillo de sello	0,011	1,69 (1,13-2,55)
Permeación linfovascular	0,0001	2,19 (1,49-3,23)
Clasificación T	0,03	3,14 (1,10-8,93)
Clasificación N	0,001	1,06 (1,02-1,10)
Estadio TNM	0,0001	9,13 (3,27-25,4)
LNR	0,0001	5,18 (1,04-15,6)
N+/T	0,0001	1,10 (1,05-1,12)

IC: Intervalo de confianza, OR: Odds ratio. LNR: Índice linfonodal.

Discusión

Los resultados principales de este estudio sugieren que:

- 1) La población de pacientes estudiados, poseen características demográficas comparables a otras publicaciones.
- 2) Los resultados quirúrgicos de morbilidad y mortalidad posoperatorio son aceptables según estándares internacionales.
- 3) Los resultados oncológicos cumplen modelos de calidad en el manejo moderno del cáncer gástrico.
- 4) En el grupo de pacientes con sobrevida menor a 5 años, la mayoría fallecen antes de los 24 meses, en su mayoría por progresión de enfermedad.
- 5) Existen distintas variables que predicen de manera significativa la población susceptible de alcanzar una sobrevida alejada posoperatoria.
- 6) El índice N+/T es una herramienta que puede ser útil en la predicción de sobrevida mayor a 5 años en pacientes operados de adenocarcinoma gástrico con intención curativa.

La presentación y tratamiento del cáncer gástrico ha cambiado en los últimos 40 años. La frecuencia de tumores distales disminuyó de 64% a 25%, la proporción de tipo intestinal: difusa pasó de 3-4:1 a casi 1:1, la tasa de reseabilidad ha aumentado de 48% a 85% ($p < 0,001$), un 75% de los casos son gastrectomías totales y la mortalidad quirúrgica ha disminuido de 25% a 0,8% ($p < 0,0001$)^{1,13}.

Figura 6. Curvas ROC. **A)** curva N+/T con un área bajo la curva igual a 0,78; **B)** curva de N+/T comparativa con T y LNR con áreas bajo la curva iguales a 0,78 y 0,79 respectivamente.

Los cambios epidemiológicos presentan distintas explicaciones¹³, mientras que los mejores resultados posoperatorios se han debido principalmente a 2 factores: “factor primario y factor secundario”, el primero hace mención al rol de cirujano y su equipo quirúrgico especializado en esta patología, mientras que el factor secundario es representado por los avances de medicamentos y las unidades de apoyo como cuidados intensivos, nutrición médica, kinesioterapias, radiología intervencional, entre otras¹⁴.

La serie estudiada en el presente artículo refleja parte de estos cambios. Es así como un 40% de los casos son lesiones difusas, 2/3 de la población requirieron de una gastrectomía total (esta cifra aumenta si se consideran el grupo de pacientes con gastrectomía total ampliada, del cual el 100% fueron totales), la morbilidad posoperatoria es de 25,9% y la mortalidad quirúrgica es 1,7%, estando estas cifras dentro de los estándares de calidad expuestos en el último consenso panamericano de cáncer gástrico¹⁵.

La SVg5 de los pacientes en el presente estudio es de 56,9%, este valor es comparable a otras publicaciones¹⁶. Al analizar los casos con sobrevida menor de 5 años cerca de un 50% fallece antes de los 24 meses, en su mayoría por progresión de enfermedad, lo cual se ha documentado en otros reportes^{4,17,18}. Un aspecto interesante es que la curva de sobrevida de la población con supervivencia mayor a 5 años, tiende a aplanarse entre el 5º y 10º año de seguimiento posoperatorio, lo que objetiva que el principal período de mortalidad en este grupo de pacientes, es en los primeros 2 años posoperatorio.

En relación a factores pronósticos de sobrevida alejada, se han diseñado guías que permiten tomar decisiones en relación a estrategias terapéuticas para optimizar el pronóstico oncológico de estos pacientes, es así como la clasificación TNM ha permitido pautar el pronóstico y manejo de estos pacientes, su última actualización es del año 2010 (AJCC, Chicago, Illinois), mientras que las últimas pautas del NCCN son de 2017⁵.

La eficacia pronóstica de la clasificación TNM y sus estadios es conocida y ha sido analizada por distintos grupos de trabajo internacionales^{7,19,20} y nacionales^{16,21,22}.

En los últimos años se han analizado distintos factores complementarios predictores de sobrevida alejada.

Género

La evidencia en relación al impacto del género en la sobrevida de pacientes con cáncer gástrico es

controversial, si bien existen artículos que defienden una significancia estadística^{23,24}, hay evidencia que se contraponen^{25,26}.

Los resultados de esta publicación sugieren una asociación entre el sexo femenino y sobrevida alejada con un $p = 0,014$ [OR: 1,88 (IC 95%: 1,15-3,07)]. Sin embargo, en el análisis multivariado no se demostró significancia estadística.

Edad

El rol de la edad en el pronóstico de los pacientes sometidos a gastrectomía por cáncer ha sido estudiado por distintos autores^{23,27,28}.

En esta serie no se logró identificar impacto pronóstico de la edad en la evolución de los pacientes tomando como margen los 70 años. Sin embargo, al evaluar la edad como variable continua, se determinó que a mayor edad existe peor pronóstico oncológico, tanto en análisis uni como multivariado con un $p = 0,008$.

Estado nutricional

El estado nutricional ha sido ampliamente estudiado por distintos autores tanto en el período preoperatorio como posoperatorio, es así como Liu analiza el impacto del IMC, la albúmina y triglicéridos preoperatorios, logrando identificar significancia en análisis multivariado de estos factores en el pronóstico de sobrevida²⁹. Jun también estudió el impacto en supervivencia del IMC preoperatorio en una población de 211 cánceres gástricos avanzados estadio II-III sometidos a cirugía curativa y quimioterapia adyuvante, sus hallazgos apoyan un factor protector de un $\text{IMC} \geq 23 \text{ kg/m}^2$, aunque no logra demostrar impacto en recurrencia³⁰. Un factor recientemente descrito es la sarcopenia en el pronóstico de estos pacientes. Zheng analizó una población cercana a 1.000 cánceres gástricos sometidos a gastrectomía radical, en su estudio logró establecer cómo la sarcopenia, definida a través del índice musculoesquelético por tomografía computada, impacta negativamente el pronóstico de los pacientes, con una sobrevida a 3 años de 55%, en comparación a la población sin sarcopenia con una sobrevida de 75%. Además, ideó un *score* pronóstico combinando cT, cN y sarcopenia, demostrando una sobrevida a 3 años de 89% en la población de bajo riesgo y de 54,8% para el grupo de alto riesgo ($p < 0,001$)²⁶. En el análisis de la evolución nutricional posoperatoria, un estudio coreano con más de 1.900 pacientes revisó en forma retrospectiva aquellos pacientes con cáncer gástrico sometidos a gastrectomía, este estudio concluyó que un $\text{IMC} > 25 \text{ kg/m}^2$ al año posoperatorio representa un factor

ARTÍCULO ORIGINAL

protector en sobrevida global en comparación a la población normopeso, alcanzando un 49% de reducción de mortalidad (HR 0,51; IC 95%: 0,26-0,98)³¹.

Células tumorales circulantes

Lee logró mostrar una mejor sobrevida libre de enfermedad en aquellos pacientes con ≤ 5 células tumorales circulantes en 7,5 ml de sangre periférica con un $p = 0,034$ ³².

Sin embargo, una desventaja de este marcador es su costo, es así como esta realidad existe en modelos experimentales, ya que resulta poco implementable, por ahora, como método de estudio para políticas públicas.

Tipo de gastrectomía

Generalmente es aceptado que aquellos tumores gástricos distales poseen mejor pronóstico que los cardiales, esto se ha atribuido a que en la cara posterior del área subcardial existe una región gástrica retroperitoneal sin cobertura serosa, la cual pudiese predisponer a una invasión tumoral de la grasa perigástrica, y por ende poseer un estadio mayor, en forma más precoz^{33,34}. De esta forma, existen reportes que atribuyen a las gastrectomías subtotales un factor protector en relación a sobrevida alejada^{7,35-42}. Esta evidencia es concordante con lo expuesto en el presente estudio donde las gastrectomías subtotales presentaron un factor protector estadísticamente significativo para sobrevida alejada con un $p = 0,01$. Sin embargo, esta asociación se pierde luego del análisis multivariado.

Pérdidas sanguíneas

Lian estudió una población de 845 cánceres gástricos estadios I-III sometidos a gastrectomía curativa. Concluyó que existe un impacto en sobrevida inversamente proporcional a las pérdidas hemáticas intraoperatorias, pérdidas menores a 200 cc presentan una sobrevida alejada de 51%, mientras que pérdidas de 200-400 cc tienen 39% y aquellas mayores de 400 cc sólo 23%²⁵.

Histología

Históricamente se ha evaluado el impacto de la diferenciación tumoral y el compromiso linfovascular en la sobrevida global de los pacientes. Al igual que lo objetivado en este trabajo, donde la presencia de células en anillo de sello, la permeación linfovascular y el compromiso perineural lograron demostrar significancia pronóstica. Un estudio chino de 323 pacientes operados en forma curativa mostró en el análisis multivariado que el grado de diferenciación,

el compromiso vascular y las metástasis linfáticas son herramientas pronósticas para determinar sobrevida libre de enfermedad, con un *hazard ratio* (HR) de 3,5, 3,4 y 4,2 respectivamente; al evaluar estos factores en el pronóstico de sobrevida global y de metástasis hematológica, sólo la diferenciación celular se mantuvo estadísticamente significativa con un HR de 1,6 y 5,6²³.

Nomograma

Una manera de integrar el valor pronóstico de distintos factores es el desarrollo de nomogramas, así un estudio norteamericano multicéntrico con más de 1.600 pacientes desarrolló un nomograma que combina: sexo, edad al momento de cirugía, localización tumoral, clasificación de Lauren, diámetro tumoral, T y N. Al seguir la pauta de su estudio se obtiene un índice de concordancia de 0,77, logrando mejorar la capacidad de predicción de sobrevida específica relacionada a enfermedad a 5 años²⁴,

Índice linfonodal

El índice linfonodal o LNR (*lymph node ratio*) compara la razón entre los linfonodos comprometidos y la cosecha linfonodal total. Se han estudiado distintos puntos de corte en subgrupos, Sin embargo, para el presente estudio se definieron los límites propuestos por un estudio chino basado en 710 pacientes sometidos a gastrectomía R0⁷, en éste se definió los márgenes LNR en 4 categorías: 0 (0%), 1 (1-9%), 2 (10-25%), 3 (> 25%). Los resultados del análisis multivariado mostraron que el índice linfonodal, a diferencia de la clasificación TNM empleada, lograba predecir sobrevida de manera independiente.

Otros autores también han logrado demostrar el impacto del LNR en la sobrevida de los pacientes^{19,21,27,40}. Estas experiencias se reproducen en el presente estudio, el LNR logró mostrar significancia estadística en el análisis multivariado, con un gran poder pronóstico en el subgrupo LNR2, con un $p < 0,0001$; OR: 10,17 (IC 95% 5,37-18,8), en su contraparte el LNR0 ofrece un factor protector para sobrevida mayor a 5 años, con un $p < 0,0001$; OR: 0,12 (IC 95% 0,07-0,21).

Índice N+/T

Respecto al índice N+/T resulta lógico pensar que la potencialidad metastásica linfonodal de un tumor dependiendo de su grado de invasión pudiese predecir en forma fidedigna el pronóstico de los pacientes. De esta forma se ideó la razón entre los linfonodos comprometidos y la clasificación T, logrando demostrarse una diferenciación significativa

entre las curvas de supervivencia global de los distintos subgrupos con un $p < 0,0001$ (Figura 5). Además, se objetivó una asociación pronóstica potente tanto en el análisis uni como multivariado para predecir supervivencia alejada a más de 5 años, con un $p < 0,0001$, 0,008 y $< 0,0001$, para los subgrupos A, B y C respectivamente. El análisis de curvas ROC (Figura 6) muestra cómo el índice N+/T posee un área bajo la curva de 0,789, sin diferencia estadísticamente significativa de los factores T y LNR con un $p = 0,96$. Si bien en el grupo de pacientes con supervivencia mayor a 5 años no se identificó diferencias pronósticas estadísticamente significativas en la evaluación de T, N y N+/T, es posible que con una población mayor de pacientes estudiados se habría alcanzado la significancia. Sin embargo, existe un reporte hecho por Moon²⁰ quien en una cohorte de 500 pacientes con cáncer gástrico avanzado tratados con intención curativa, identifica que posterior a los 5 años de seguimiento, el TNM no logra predecir evolución excepto en estadios IV y sobre los 10 años de seguimiento ninguna de las variables estudiadas predijo evolución.

Las publicaciones nacionales enfocadas a pronóstico de supervivencia en cáncer gástrico se han centrado en distintos aspectos. En términos de SVg5 la primera publicación chilena fue realizada por Frenkel en 1954⁴³, donde describió una SVg5 de 12,7%. Veinte años después en 1974, Csendes reportó el primer estudio multicéntrico de SVg5 en cáncer gástrico en Chile. Dicha publicación objetivó una SVg5 de 19% en los pacientes resecados⁴⁴, desde entonces esta tasa se ha mejorado hasta cifras cercanas a 49% y 65%^{21,22,35,55}. Al evaluar exclusivamente los cánceres incipientes Csendes recientemente publicó una SVg5 de 88% y de 72% a 15 años⁴⁵, mientras que Ceroni publicó una SVg5 de 98% y de 94,7% a 10 años¹⁶ (Tabla 7).

En cuanto al estudio de variables pronósticas de esta supervivencia, la mayoría de las publicaciones se enfocan en variables similares, como la clasificación de Lauren, la profundidad de invasión tumoral, el compromiso linfonodal y el estadio oncológico según clasificación TNM^{4,16,21,22,35,36-39,44,46-51,55}. Algunas publicaciones han estudiado el impacto de la gastrectomía subtotal^{35-39,55}, menos publicaciones han estudiado el impacto de la presencia de células en anillo de sello^{36,53}, el uso de adyuvancia^{48,52,54}, complicaciones posoperatorias⁴⁸ y el índice linfonodal²¹. Las fortalezas de este trabajo son: a) tener una población estudiada numerosa y representativa de la realidad nacional e internacional; b) dicha población ha sido manejada siguiendo estándares internacionales de tratamiento del cáncer gástrico

Tabla 7. Supervivencia a 5 años reportada por autores chilenos en el tratamiento del cáncer gástrico con resecciones con intención curativa

Autor	Año	n	SVg > 5 años (%)
Csendes ⁴⁴	1974	752	19
Csendes ⁵¹	1975	285	21,4
Burmeister ³⁸	1986	70	45,7
Csendes ⁵⁵	1993	233	60
Cenitagoya ⁴	1997	286	41,2
Venturelli ³⁵	1999	94	44,1
Stambuk ²¹	2006	108	48,9
García ²²	2007	423	52
Butte ³⁷ *	2008	105	90,5
Tapia ⁵³	2010	451	51
Venturelli ³⁶	2010	52	47
Ceroni ¹⁶ *	2011	161	98
Csendes ⁴⁵ *	2015	304	88
Norero ⁴⁸	2016	580	39
Manterola ⁴⁹	2016	22	37
Figueroa	2017	284	56,9

*Publicaciones que analizan sólo cáncer gástrico incipiente.

con intención curativa por un número reducido de cirujanos expertos en este tema; c) analizar el mayor número de variables pronósticas de supervivencia alejada en cáncer gástrico reportado en la literatura nacional y d) aportar un nuevo índice predictor de supervivencia.

Las debilidades de esta investigación son: a) ser un estudio retrospectivo, sometido a los sesgos propios de dicha metodología; b) abarcar un período de tiempo donde existió un cambio de clasificación TNM (de 6ª a 7ª edición) lo cual impacta en la clasificación y posiblemente en el manejo de estos pacientes.

En conclusión, el presente estudio logra demostrar la presencia de distintos factores pronósticos de cáncer gástrico concordantes con evidencias internacionales. Los factores pronósticos independientes de supervivencia mayor a 5 años son: índice N+/T, LNR, edad, permeación linfovascular, clasificación T, clasificación N y estadio TNM. Concomitantemente se ha logrado aportar un nuevo cuociente pronóstico en la evaluación de pacientes con adenocarcinoma gástrico resecados con intención curativa, el índice N+/T.

ARTÍCULO ORIGINAL

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. El autor declara que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. El autor declara que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. El autor ha obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Financiación

El autor declara no haber recibido ninguna financiación para la realización de este trabajo.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

Prof. Dr. Attila Csendes por su tutoría en el desarrollo del estudio. Drs. Katya Carrillo y Stefan Dánilla por su apoyo estadístico. EU. Solange Cortés por su trabajo en la mantención de la base de datos oncológica HCUCH.

Bibliografía

- Csandes A, Burdiles P, Braghetto I, Díaz JC, Maluenda F, Korn O, et al. Resecabilidad y mortalidad operatoria de la gastrectomía subtotal y total en paciente con cáncer gástrico avanzado entre 1969 y 2004. *Rev Med Chile*. 2006;134:426-32.
- Armijo R, Detels R, Coulson A, Medina E, Orellana M, González A. Epidemiología del cáncer gástrico en Chile. *Rev Med Chile*. 1981;109:551-6.
- Otaiza E, Lopetegui G, Csendes A. Operabilidad y resecabilidad del cáncer gástrico. *Rev Med Valpo*. 1969;22:228-30.
- Cenitagoya G, Berghi C, Keniger J, Casanueva D. Cáncer gástrico. Sobrevida real a 5 años. *Rev Chil Cir*. 1997;49:629-32.
- NCCN Guidelines Version 1.2017, 03/21/17. Gastric Cancer. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp
- Venturelli A, Díaz, JC, Avendaño R. Sobrevida del cáncer gástrico en Chile. En Csendes A, Burdiles P, Korn O. *Cáncer Gástrico*. Capítulo 29; editorial Mediterráneo, Santiago de Chile. 2ª ed. 2006;279-85.
- Alatengbaolide, Lin D, Li Y, Xu H, Chen J, Wang B, et al. Lymph Node Ratio Is an Independent Prognostic Factor in Gastric Cancer After Curative Resection (R0) Regardless of the Examined Number of Lymph Nodes. *An J Clin Oncol*. 2013;36:325-30.
- Guía Clínica diabetes mellitus tipo 2. Serie guías clínicas MINSAL. Santiago, MINSAL, 2010.
- Guía clínica AUGÉ. Examen medicina preventiva. Serie Guías clínicas MINSAL. Santiago: MINSAL, 2013.
- Guía clínica AUGÉ. Hipotiroidismo en personas de 15 años y más. Serie Guías clínicas MINSAL. Santiago: MINSAL, 2013.
- Guía clínica hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más. Santiago: MINSAL, 2010, Normas técnicas. Dislipidemias. Santiago: MINSAL, 2000.
- Tiret L, Hatton F, Desmonts JM, Vourch G. Prediction of outcome of anaesthesia in patients over 40 years: A multifactorial risk index. *Stat Med*. 1988;7:947-54.
- Csendes A, Figueroa M. Situación del cáncer gástrico en el mundo y en Chile. *Rev Chil Cir*. 2017;69:502-7.
- Csendes A, Braghetto I, Díaz JC, Castillo J, Rojas J, Cortés S. Morbilidad y mortalidad operatoria de la gastrectomía subtotal y total por cáncer gástrico 2004 a 2010. Parte I de un estudio prospectivo. *Rev Chil Cir*. 2011;63:583-8.
- Consenso 3º Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico. 2016, Santiago de Chile.
- Ceroni M, García C, Benavides C, Covacevich S, Rubilar P, Cid H, et al. Seguimiento mayor a 10 años de pacientes operados por cáncer gástrico incipiente. *Rev Chil Cir*. 2011;63:591-8.
- Verlato G, Marrelli D, Accordini S, Bencivenga M, Di Leo A, Marchet A, et al. Short-term and long-term risk factors in gastric cancer. *World J Gastroenterol*. 2015;21:6434-43.
- Csendes A. ¿Recurrencia o progresión de cáncer? *Rev Chil Cir*. 2005;57:288-90.
- Nakagawa M, Choi YY, An JY, Hong JH, Kim JW, Kim HI, et al. Staging for Remnant Gastric Cancer: The Metastatic Lymph Node Ratio vs. the UICC 7th Edition System. *Ann Surg Oncol*. 2016;23:4322-31.
- Moon Y, Jeung H, Rha S, Yoo N, Roh J, Noh S, et al. Changing Patterns of Prognosticators During 15-Year Follow-Up of Advanced Gastric Cancer after Radical Gastrectomy and Adjuvant Chemotherapy: A 15-Year Follow-Up Study at a Single Korean Institute. *Ann Surg Oncol*. 2007;14:2730-7.
- Stambuk J. Resultados inmediatos y sobrevida alejada en cáncer gástrico: Estudio de 108 pacientes sometidos a gastrectomía total radical D2 con criterio R0. *Rev Chil Cir*. 2006;58:420-30.
- García C, Benavides C, Apablaza S, Rubilar P, Covacevich R, Peñaloza P, et al. Resultados del tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico. Análisis de 423 casos. *Rev Med Chile*. 2007;135:687-95.
- Huang B, Wang Z, Xing C, Sun Z, Zhao B, Xu H. Long-term survival results and prognostic factors of early gastric cancer. *Exp Ther Med*. 2011;2:1059-64.
- Dikken J, Baser R, Gonen M, Kattan M, Shah M, Verheik M, et al. Conditional

- Probability of Survival Nomogram for 1-, 2-, and 3-Year Survivors After an R0 Resection for Gastric Cancer. *Ann Surg Oncol.* 2013;20:1623-30.
25. Lian Y, Gu H, Deng J, Wang B, Ding X, Wang X, et al. Impact of intraoperative blood loss on survival after curative resection for gastric cancer. *World J Gastroenterol.* 2013;17:5542-50.
 26. Zheng Z, Lu J, Zheng C, Li P, Xie J, Wang J, et al. A Novel Prognostic Scoring System Based on Preoperative Sarcopenia Predicts the Long-Term Outcome for Patients After R0 Resection for Gastric Cancer: Experiences of a High-Volume Center. *Ann Surg Oncol.* 2017;24:1795-803.
 27. Posteraro B, Persiani R, Dall'Armi V, Biondi A, Arzani D, Sicoli F, et al. Prognostic factors and outcomes in Italian patients undergoing curative gastric cancer surgery. *EJSO.* 2014;40:345-51.
 28. Jie, Chen J, Xu Y, Long Z, Zhou Y, Zhu H, et al. Impact of Age on the Prognosis of Operable Gastric Cancer Patients. An Analysis Based on SEER Database. *Medicine* 2016;95:e3944.
 29. Liu BZ, Tao L, Chen YZ, Li XZ, Dong YL, Ma YJ, et al. Preoperative Body Mass Index, Blood Albumin and Triglycerides Predict Survival for Patients with Gastric Cancer. *Plos ONE.* 2016;11:e0157401.
 30. Jun DH, Kim BJ, Park JH, Kim JG, Chi KC, Park JM, et al. Preoperative Body Mass Index May Determine the Prognosis of Advanced Gastric Cancer. *Nutr Cancer.* 2016;68:1295-300.
 31. Lee HH, Park JM, Song KY, Choi MG, Park CH. Survival impact of postoperative body mass index in gastric cancer patients undergoing gastrectomy. *Eur J Cancer.* 2016;52:129-37.
 32. Ito H, Sato J, Tsujino Y, Yamaguchi N, Kimura S, Gohda K, et al. Long-term prognostic impact of circulating tumor cells in gastric cancer patients. *World J Gastroenterol.* 2016;14:10232-41.
 33. Siewert JR, Böttcher K, Stein HJ, Roder JD, Busch R. Problem of proximal third gastric carcinoma. *World J Surg.* 1995;19:523-31.
 34. Testut L, Latarjet. Estómago, en: Anatomía Humana. Salvat, Barcelona, 9ª ed. Tomo IV, Capítulo I. 1971:184-187 y 207-8.
 35. Venturelli A, Cardemil B, Díaz J, Avendaño R, Murúa A, Kuschel C, et al. Cirugía más quimioterapia en cáncer gástrico: sobrevida a 5 años. *Rev Chil Cir.* 1999;51:170-5.
 36. Venturelli F, Venturelli A, Cárcamo M, Cárcamo C, Jara C, Felmer O, et al. Gastrectomía subtotal en el cáncer gástrico antral mal diferenciado e indiferenciado. *Rev Chil Cir.* 2010;62:240-5.
 37. Butte J, Torres J, Viviani P, Duarte I, Crovari F, Guzmán S, et al. Sobrevida alejada de pacientes operados por cáncer gástrico incipiente. *Rev Med Chile* 2008;136:1424-30.
 38. Burmeister R, Pepper J, Fernandez M. Sobrevida a largo plazo del cáncer gástrico. *Rev Chil Cir.* 1986;38:193-6.
 39. Csendes A, Medina E. Sobrevida de pacientes con cáncer gástrico. III Sobrevida del cáncer avanzado según tipo de resección quirúrgica. *Rev Med Chile.* 1975;103:244-6.
 40. Wang W, Li YF, Sun X, Chen YB, Li W, Xu DZ, et al. Prognosis of 980 patients with gastric cancer after surgical resection. *Chinese Journal of Cancer.* 2010;29:923-30.
 41. Bolt WJ, Devesa SS, Kneller RW, Fraumeni JF Jr. Rising incidence of adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia. *JAMA.* 1991;265:1287-9.
 42. Craanen ME, Dekker W, Blok P, Ferwerda J, Tytgat GN. Time trends in gastric carcinoma: changing patterns of type and location. *Am J Gastroenterol.* 1992;87:572-9.
 43. Frenkel A. Cáncer gástrico y gastrectomía total. *Archivos Sociedad de Cirujanos.* 1954;6:1597-618.
 44. Csendes A, Medina E. Sobrevida de pacientes con cáncer gástrico. I Sobrevida global en casos operables y no operables. *Rev Med Chile.* 1974;102:837-840.
 45. Csendes A, Díaz JC, Musleh M, Lanzarini E, Braghetto I, Zamorano M. Evolución durante 44 años de las características morfológicas y sobrevida a largo plazo de 304 pacientes con cáncer gástrico incipiente. *Rev Chil Cir.* 2015;67:175-80.
 46. Pimentel F, Guzmán S, Llanos O, Rahmer A, Zúñiga A, Meissner A. Cáncer gástrico: resultados quirúrgicos y sobrevida. *Rev Med Chile.* 1988;116: 525-31.
 47. Astete G, Lynch O, Madariaga J, Zilic M, Martínez L. Patrón pronóstico de invasión serosa (S2) en carcinoma gástrico. *Rev Chil Cir.* 2002;54:644-8.
 48. Norero E, Bustos M, Herrera ME, Cerda J, González P, Ceroni M, et al. Postoperative adjuvant treatment for gastric cancer improves long-term survival after curative resection and D2 lymphadenectomy. Results from a Latin American Center. *EJSO.* 2016;42: 94-102.
 49. Manterola C. Cáncer Gástrico Avanzado. Resultados Observados en un Centro Regional Privado de Salud. *Int J Med Surg.* 2016;3:741-6.
 50. Venturelli F, Cárcamo C, Venturelli A, Cárcamo M, Born M, Jara C, et al. Análisis de sobrevida del cáncer gástrico en anillo de sello según profundidad y compromiso linfonodal. *Rev Chil Cir.* 2008;60:398-402.
 51. Csendes A, Medina E, Smok G, Kubo T. Sobrevida de pacientes con cáncer gástrico. II Sobrevida según profundidad aparente de la infiltración tumoral. *Rev Med Chile.* 1975;103:110-2.
 52. Flores P, Yáñez E, Cartes R, Grájeda J, Villaseca M, Fernández E, et al. Quimiorradioterapia posoperatoria en el tratamiento del cáncer gástrico. *Rev Chil Cir.* 2000;52:621-8.
 53. Tapia O, Gutiérrez V, Roa JC, Manterola C, Villaseca M, Araya JC. Carcinoma de células en anillo de sello gástrico: Descripción clínico-morfológica y valor pronóstico. *Rev Chil Cir.* 2010;62:458-64.
 54. Csendes A, Cortés S, Guajardo M, Figueroa M. Sobrevida de pacientes con cáncer gástrico etapas IIIC y IV sometidos a cirugía. Parte II de estudio prospectivo 2004-2012. *Rev Chil Cir.* 2014;66:451-9.
 55. Csendes A, Medina E, Smok G, Korn O. Sobrevida a largo plazo de pacientes con cáncer gástrico sometidos a gastrectomía subtotal. *Rev Med Chile.* 1993;121:1388-94.