CASO CLINICO-RADIOLOGICO PARA DIAGNOSTICO

Int. Pablo Avaria⁽¹⁾, Dr. Andrés O'Brien⁽²⁾.

1. Interno séptimo año. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile.

2. Departamento de Radiología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Historia clínica

Mujer de 47 años de edad, con historia de haber consultado por un cuadro de dolor abdominal tipo cólico, hipogástrico, severo, de aproximadamente 18 días de evolución. Se estudió con coprocultivo, leucocitos fecales, serología para *yersinia*, y colonoscopia, todos dentro de límites normales. La tomografía computada (TC) de abdomen y pelvis mostró hallazgos compatibles con ileitis distal asociada a dilatación de asas de intestino proximal y miomas uterinos; dada la buena evolución clínica se dió de alta con manejo sintomático y tratamiento antibiótico.

Paciente consulta nuevamente 10 días más tarde, por un cuadro de similares características al anterior, con dolor más intenso, asociado a distensión abdominal marcada, disminución en la eliminación de gases y constipación de 2 días de evolución, por lo que se realiza nueva TC de abdomen y pelvis (Figura 1 y Figura 2).

Figura 1.

Figura 2.

Diagnóstico y discusión en página 99.

RESULTADO CASO CLINICO RADIOLOGICO PARA DIAGNOSTICO

Int. Pablo Avaria⁽¹⁾, Dr. Andrés O'Brien⁽²⁾.

1. Interno séptimo año. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile.

2. Departamento de Radiología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Viene de la página 56.

Diagnóstico:
Endometriosis de íleon distal, causa infrecuente de obstrucción intestinal.

En la TC (Figura 1) se observa engrosamiento parietal de íleon distal, compatible con una ileítis, con mayor dilatación secundaria del intestino delgado proximal.

Figura 1. TC de abdomen y pelvis, corte axial. Engrosamiento en íleon distal, mal definido.

Se obtiene el antecedente que en ambas consultas, el dolor abdominal coincidió con el inicio del ciclo menstrual. Evaluada por ginecología, la paciente refiere dismenorrea severa, dispareunia invalidante, dolor pélvico crónico cíclico en relación a la menstruación y existencia de una hermana con diagnóstico de endometriosis. Dados estos antecedentes y los hallazgos de los estudios radiológicos, se sugiere el diagnóstico de endometriosis intestinal y se decide complementar estudio con enteroclis por tomografía computada (E-TC) (Figura 2), que muestra engrosamiento masiforme excéntrico a nivel de íleon distal, asociado a lesión quística adyacente,

con contenido hemorrágico y signos de obstrucción parcial de intestino delgado, que corresponde como primera posibilidad a foco de endometriosis.

Figura 2a. Enteroclis por TC, corte axial. Engrosamiento excéntrico, a diferencia de la figura anterior, mayor definición gracias a enteroclis.

Figura 2b. Enteroclis por TC, corte axial. Engrosamiento excéntrico masiforme de íleon distal.

Figura 2c. Enteroclisia por TC. Lesión quística con nivel líquido-líquido hacia posterior (flecha).

Figura 2d. Enteroclisia por TC, corte coronal. Engrosamiento excéntrico de íleon distal.

Dados estos hallazgos, se decide resolución quirúrgica, que consistió en la resección laparoscópica del íleon terminal y ciego, con posterior anastomosis entero-cólica. La anatomía patológica mostró un segmento de íleon con endometriosis multifocal en túnica muscular propia y subserosa, asociada a endometriomas peri-ileales.

Discusión

La endometriosis es un desorden ginecológico común en mujeres en edad fértil, de carácter crónico, benigno, cíclico y dependiente de estrógenos. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres nulíparas, entre los 25 y los 45 años (33 años en promedio)^(1,2-4).

Se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera de su ubicación normal en el útero. Los órganos más afectados son el peritoneo pélvico y los órganos reproductivos, que incluyen ovarios, trompas de Falopio y septo rectovaginal. También puede afectar el tracto gastrointestinal (12%)⁽⁵⁾, siendo el rectosigmoide el sitio más afectado (85%), seguido en frecuencia por colon derecho, intestino delgado, ciego y apéndice.

Su prevalencia alcanza hasta el 15% de las mujeres menstruantes⁽⁶⁾. Sus principales manifestaciones clínicas incluyen dolor pélvico, en general asociado a la menstruación, infertilidad, dispareunia y dismenorrea^(1,7-9). Cuando existe compromiso del tracto gastrointestinal, puede manifestarse por dolor abdominal difuso, dolor rectal, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, tenesmo y hemorragia digestiva baja.

Aún no está claro el sustrato fisiopatológico detrás de la aparición de endometriosis. La teoría más aceptada considera la regurgitación menstrual transtubaria, con implantación de células glandulares y de estroma endometrial en la serosa de órganos pélvicos y abdominales^(1,10). Alternativamente, el crecimiento extrauterino de tejido endometrial pudiera ocurrir por transformación metaplásica de mesotelio pluripotencial peritoneal.

Las manifestaciones gastrointestinales de la endometriosis fueron descritas por Meyer *et al.*⁽³⁾, caracterizándose por cuadros clínicos inespecíficos, incluyendo náuseas, vómitos, dolor abdominal difuso y distensión abdominal, por lo que el diagnóstico preoperatorio es difícil y requiere de alta sospecha diagnóstica, pudiendo confundirse con síndrome de intestino irritable, enteritis regional, enfermedad de Crohn, apendicitis, colitis isquémica, diverticulitis y neoplasias. Las biopsias endoscópicas también pueden ser confusas, ya que sólo consideran las capas más internas, que podrían presentar signos de inflamación crónica sin focos de endometriosis, porque éstos en general están en la serosa^(11,12).

Las complicaciones abdominales quirúrgicas son más frecuentes a nivel de recto y colon sigmoide^(1,9,13-15), incluyendo hemorragia digestiva baja, constipación crónica y obstrucción intestinal. El compromiso de íleon distal es poco frecuente y puede presentarse como obstrucción intestinal, siendo ésta una causa poco habitual de obstrucción, ya que las más frecuentes son bridas, hernias y tumores.

En casos más avanzados se puede presentar como obstrucción intestinal, siendo el íleon la zona de transición más frecuente en el intestino delgado, existiendo engrosamiento masiforme a ese nivel, usualmente excéntrico. Existen reportes de estenosis ileal secundaria a endometriosis, que condiciona obstrucciones más bien crónicas; sin embargo, la presentación más frecuente es una obstrucción solitaria en íleon terminal, que debe ser resecada⁽¹⁶⁾. La

resección de intestino delgado por obstrucción intestinal es necesaria en el 0.7% de todas las pacientes que requieren cirugía por endometriosis intestinal⁽¹⁷⁾.

La E-TC consiste en una TC de abdomen y pelvis con contraste endovenoso bifásico, tras la administración de 2 litros de agua a través de una sonda nasointestinal localizada a nivel de yeyuno proximal, lo que permite distender las asas de intestino delgado en forma adecuada, con alto rendimiento en la detección de patologías intestinales⁽¹⁸⁾. Esto permite una adecuada evaluación, no sólo de la pared intestinal sino que del mesenterio adyacente, con posibilidad de reconstrucciones multiplanares. El hallazgo de engrosamiento masiforme asimétrico en relación al íleon distal, asociado a una lesión quística con componente hemorrágico es altamente sugerente de esta patología. En el diagnóstico diferencial debe considerarse patología neoplásica y menos probablemente inflamatoria; esta última por lo general determina un engrosamiento parietal concéntrico con estratificación de la pared⁽¹⁹⁾.

Tanto el tratamiento médico de la endometriosis no complicada como la terapia post quirúrgica consisten en la supresión hormonal, que produce involución y eventual atrofia de los focos de endometriosis^(2,3). Existen diferentes esquemas terapéuticos que incluyen el uso de danazol, esteroides antiprogesteronales, anticonceptivos orales, agonistas de GnRH, antiinflamatorios no esteroidales.

En conclusión, la endometriosis es una causa infrecuente de obstrucción intestinal, requiere de alto índice de sospecha y debe ser considerada en pacientes sin antecedentes de cirugías previas, con dolor abdominal severo, cíclico y asociado al período menstrual. La E-TC es una modalidad diagnóstica de gran utilidad por su alto rendimiento en patologías de intestino delgado, con las ventajas de la TC multicorte.

Bibliografía

1. Duepre HJ, Senagore AJ, Delaney CP, Marcello CP, Brady KM, Falcone T. Laparoscopic resection of deep pelvic endometriosis with rectosigmoid involvement. *J Am Coll Surg* 2002; 195: 754-758.
2. Fagan CJ. Endometriosis: clinical and roentgenographic manifestations. *Radiol Clin North Am* 1974; 12:109-125.
3. Meyers WC, Kelvin FM, Jones RS. Diagnosis and surgical treatment of colonic endometriosis. *Arch Surg* 1979; 114: 169-175.
4. Douglas C, Rotimi O. Extragenital endometriosis. A clinicopathological review of a Glasgow hospital experience with illustrations. *J Obstet Gynaecol* 2004; 24: 804-808.
5. Macafee CHG, Greer HLH. Intestinal endometriosis. *BR J Obstet Gynecol* 1960; 67: 539-555.
6. Gerbie A, Merrill J. Pathology of Endometriosis. *Clin Obstet and Gynecol*. 1988, 31(4): 779-889.
7. Giudice LC, Kao LC. Endometriosis. *The Lancet* 2004; 364:1789-99.
8. Olive DL, Pritts EA. Treatment of endometriosis. *N Engl J Med* 2001; 345: 266-274.
9. Kumar D. Irritable bowel syndrome, chronic pelvic disease and endometriosis. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2004; 16:1251-2.
10. Markham S, Carpenter SE, Rock JA. Extrapelvic endometriosis. *Obstet Gynecol Clin North Am* 1989; 16:193-219.
11. Scarmato VJ, Levine MS, Herlinger H, Wickstrom M, Furth EE, Tuttle RW. Ileal endometriosis: radiographic findings in five cases. *Radiology*. 2000; 214(2): 509-12.
12. Yantiss RK, Clement PB, Young RH. Endometriosis of the intestinal tract: a study of 44 cases of a disease that may cause diverse challenges in clinical and pathologic evaluation. *Am J Surg Pathol*. 2001; 25(4): 445-54.
13. Bailey HR, Ott MT, Hartendorp P. Aggressive surgical management for advanced colorectal endometriosis. *Dis Colon Rectum* 1994; 37: 747-53.
14. Cameron IC, Rogers S, Collins MC, Reed MW. Intestinal endometriosis: Presentation, investigation, and surgical management. *Int J Colorectal Dis* 1995; 10: 83-86.
15. Midorikawa Y, Kubota K, Kawai K, Mori M, Kajiura N. Endometriosis of the rectum causing bowel obstruction: A case report. *Hepatogastroenterology* 1997; 44: 706-709.
16. Singh KK, Lessells AM, Adam DJ, Jordan C, Miles WF, Macintyre IM, et al. Presentation of endometriosis to general surgeons: a 10-year experience. *BR J Surg* 1995; 82: 1.349-1.351.
17. Prystowsky JB, Stryker SJ, Ujiki GT, Poticha SM. Gastrointestinal endometriosis. Incidence and indications for resection. *Arch Surg* 1988; 123: 855-8.
18. O'Brien A, Cruz JP, Berrios C, Melipillán Y, Butte JM, Alvarez M. Advances in radiography of the small intestine: computed tomography enteroclysis. *Gastroenterol Hepatol* 2006; 29(9): 528-33.
19. Paulsen SR, Huprich JE, Fletcher JG, Booya F, Young BM, Fidler JL, Jonson CD, Barlow JM, Earnest F 4th. CT enterography as a diagnostic tool in evaluating small bowel disorders: review of clinical experience with over 700 cases. *Radiographics* 2006(3): 641-57; discussion 657-62.