Servicio de Tisiología
"Hospital Arriarán"
Sanatorio "Los Guindos"
del Consejo de Defensa del Niño.

LA ATELECTASIA PULMONAR EN EL NIÑO Y SUS RELACIONES CON LA TUBERCULOSIS PRIMARIA

Por los D^{tes}. JORGE PEÑA CERECEDA, ERNESTINA PEÑA D.
y LUCILA CAPDEVILLE

(Continuación)

OBSERVACION CLINICA N.º 25.—Servicio de Tuberculosis, 44671.—
H. Arriarán.

O. V.—5 años.—Ingreso: 9-VI-42.

ANTECEDENTES.—Un tuberculoso adulto convivió en la casa hasta su muerte, 8 meses antes de ser hospitalizado. Sarampión hace un año.

ENFERMEDAD ACTUAL.—Inscrito en el Policlínico de Tuberculosis, porque se queja de tos intensa, anorexia y transpiración nocturna.

Al examen encontramos un niño pálido y afebril. Mantoux al 1 por mil: positivo. Sedimentación: 40-80 mm/h. Peso: 15 kg.

Al examen pulmonar se aprecia, submacidez ligera de la base izquierda.

La radiografía 35151 (3-V-42, figura 22-a), revela una sombra difusa, densa, con aspecto de infiltración pulmonar, que ocupa el tercio medio y parte del tercio inferior izquierdo. El resto del área no presenta alteraciones.

La radiografía lateral 35254, del 10-VI-42, muestra que la sombra del hemitórax izquierdo se proyecta en forma redondeada, de límites no bien p^{re}ci^{sos}, situada en la parte media y posterior del hemitórax.

BRONCOSCOPIA.—(20-VI-42). Mucosa de la tráquea y de los bronquios, roja, tumefacta, engrosada y edematosa, siendo más marcada la tumefacción en el lado izquierdo. Asimismo en este bronquio hay secreción mucopurulenta. Se extrajeron por aspiración, alrededor de 200 cc. de secreción (Dr. Parada).

El examen general, después de la broncoscopia, revela un niño en buen estado general, con apetito. Tos escasa, expectoración abundante. Afebril.

El examen pulmonar muestra una ligera submacidez de la base izquierda. No hay modificaciones en el aspecto radiológico.

Sedimentación: 12-25 mm/h. Peso: 16.500 kg.

PLEUROSCOPIA.—(27-VII-42). Previo neumotórax, en la línea axilar anterior, lado izquierdo.

FIGURA N.º 22. — OBSERVACION N.º 25

a) Sombra de atelectasia a nivel del tercio superior izquierdo; b) La lesión ha desaparecido casi por completo.

FIGURA N.º 22. — OBSERVACION N.º 26

a') Imagen casi total de atelectasia del hemitórax izquierdo; b') La lesión ha desaparecido casi en su totalidad.

El pleuroscopio penetra a través de una serie de adherencias, lo que dificulta la pleuroscopia. Se encuentran varios sistemas adherenciales ápico-apicales anteriores, laterales y posteriores, que forman hacia el mediastino, una sinfisis. Se encuentra la pleura reluciente, con aspecto edematoso y pequeñas bulas de enfisema en la región mediastinal. Hacia abajo, el lóbulo inferior se encuentra totalmente libre, con sólo una pequeña adherencia diafragmática libre.

No se pudo precisar imagen de atelectasia por la dificultad de la pleuroscopia. (Dres. Berr-Vigorena. Hosp. "San José".)

Radiografía 36748, del 3-X-42, después de la pleuroscopia, (figura 22-b). La sombra del hemitórax izquierdo ha disminuido apreciablemente de tamaño e intensidad y es de fondo algo irregular. (Infiltrado en reabsorción). Resto: normal.

Radiografía lateral 37143, indica que las sombras del hemitórax izquierdo se proyectan en relación con la bifurcación de los bronquios. Visibilidad de la cisura.

El 4-X-42 el examen general revela buen estado general. Buen apetito, no hay tos. Afebril. Sedimentación 10-25 mm/h. Peso: 17 kg. Examen pulmonar: negativo.

BRONCOSCOPIA (control).—28-I-43. Mucosa de la tráquea y bronquios de coloración normal. Regular cantidad de secreción mucopurulenta. Espolón de los bronquios, tal vez un poco achatado. Bronquios permeables como en el estado normal (Dr. Parada).

El examen general del 22-III-43, revela muy buen estado. Afebril. Apetito bueno. Examen pulmonar: negativo.

Sedimentación: 8-15 mm/h. Peso: 18 kg.

Comentario.—Se hizo el diagnóstico de atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, por obstrucción de un bronquio de ese lado, como lo prueba el examen broncoscópico. La pleuroscopia y el estudio de las presiones endopleurales no dieron ninguna luz, por existir numerosas adherencias pleurales.

Llama la atención la forma redondeada de la lesión al examen radiográfico frontal y lateral, y su reducción de tamaño más o menos 5 meses después, junto con la desaparición de la inflamación de la mucosa y la reducción del exudado bronquial.

OBSERVACION CLINICA N.º 26.—Servicio de Medicina 30137.—H. Arriarán.

F. C.—6 años.—Ingreso: 20-II-41.

ANTECEDENTES.—Madre con lúes y tuberculosis. No acusa antecedentes mórbidos.

ENFERMEDAD ACTUAL.—Consulta en el Policlínico de Medicina, por un cuadro angustioso, con disnea y asfixia, que se inicia tres días atrás, acompañado de fiebre persistente, lo que hace pensar en un crup diftérico. Sin embargo, al día siguiente la sintomatología aguda pasó por completo. Dos días después presenta una nueva crisis, semejante a la anterior, que se repite en forma intermitente y caprichosa varias veces más. Se piensa también en un falso crup.

La radioscopia: negativa. Pirquet: negativo, Kahn: negativo.

Una semana después del ingreso, aparecen roncus, estertores gruesos y respiración bronquial en el hemitórax izquierdo.

La radiografía 29181 del 7-III-41, (figura 22-a'), dice: sombra difusa, homogénea, de intensidad mediana, que ocupa todo el hemitórax izquierdo, el que se ve retraído. Tracción de los órganos del mediastino hacia el lado izquierdo. Campo derecho normal. Un nuevo interrogatorio a la madre, hace pensar que el niño haya aspirado un cuerpo extraño (pepas de sandía?).

Al día siguiente se practicó una BRONCOSCOPIA, que resultó muy laboriosa, pero se lograron extraer varios trozos disgregados de naturaleza vegetal, correspondientes a las semillas con que jugaba el niño, el día que comenzó la enfermedad.

Desde entonces, no se reprodujeron las molestias y el niño continuó perfectamente.

La segunda radiografía fué tomada 10 días después de la primera (29302, 17-III-42, figura 22-b'). Muestra la desaparición de la extensa zona de atelectasia que se veía anteriormente.

Examen pulmonar: negativo. Se da de alta, sano.

Comentario.—Llama la atención el hecho de que la atelectasia se produjera sólo 13 días después de la aspiración del cuerpo extraño. Seguramente ha debido producirse un proceso inflamatorio local, con exudado, para determinar el cierre total del bronquio. El aumento o disminución de las secreciones, explicaría también la intermitencia de las crisis de asfixia que presentaba el enfermito.