Hospital Luis Calvo Mackenna.
Cátedra Extraordinaria de Pediatría.

ENFERMEDAD HEMOLÍTICA EN EL NIÑO (1)

Por el Prof. Dr. ANIBAL ARIZTIA

Las afecciones con reacción hemolítica en el niño forman un capítulo para cuyo esclarecimiento se hace indispensable la colaboración armónica de clínicos y hematólogos. No sólo con fines de diagnóstico preciso, lo que podría parecer sólo de valor académico, sino con fines de pronóstico y terapéutica. Para esto último se requiere, además, el concurso del transfusor experimentado en bio-hematología. Por ello considero de gran utilidad esta reunión conjunta.

En esta reunión quiero hacer consideraciones sobre ciertos aspectos clínicos del grupo de afecciones en cuestión y plantearles a los hematólogos y transfusores la ayuda que de ellos esperamos, a la vez que puntualizar el papel que cabe al clínico en la búsqueda del diagnóstico y fijación del tratamiento adecuado. Si bien es cierto que, en ciertos casos, con una buena anamnesis y examen clínico puede afirmarse el diagnóstico que el hematólogo vendrá a confirmar, anemia o ictericia-hemolítica familiar, en muchos casos de eritroblastosis fetales, etc., en otros, el clínico deberá mantener el diagnóstico en suspenso hasta que venga la ayuda del hematólogo experimentado: anemia falciforme que ya se está viendo, no es exclusiva de la raza negra, ciertas formas hemolíticas con reacciones perniciosiforme de la infancia, como veremos más adelante.

Deseo en esta oportunidad hacer presente a los hematólogos, basándome para ello en mi experiencia, que el clínico

(1) Conferencia en la reunión conjunta de la Sociedad Chilena de Pediatría y Sociedad de Hematología, para el Congreso de Hematología, el 7 de noviembre de 1946.

pediatra necesita la cooperación del hematólogo que esté habituado al estudio de los problemas correspondientes a la infancia. Son demasiado conocidas de los pediatras las reacciones hematológicas en el niño, sobre todo en el lactante, cuyo reflejo en el hemograma podría hacer pensar al que acostumbra practicar exámenes en el adulto, en síndromes perniciosos, leucémicos, formas aplásticas, que podrían inducirlo a informar al médico en el sentido que éste se incline a formular un pronóstico fatal, cuando en realidad muchas veces se trata de reacciones propias de la infancia con su sistema hematopoiético corrientemente lábil y propenso a reacciones de tipo embrionario, o bien arregenerativo pasajero. Otro tanto ocurre con reacciones hemolíticas agudas o sub agudas, como respuesta a infecciones o daños alimenticios que rara vez se observan en el adulto. Sobre estos puntos tuve oportunidad de insistir en el trabajo sobre "Anemias del lactante", presentado en las jornadas médicas del centenario de la Universidad, con varias observaciones demostrativas.

Estas consideraciones nos llevan a puntualizar desde luego el concepto de "enfermedades hemolíticas" en la infancia. En clínica entendemos por hemolisis, no el fenómeno en sentido estricto, que indicaría una solución de la membrana celular con escape y disolución de la hemoglobina, según ocurre con ciertos venenos hemolíticos, o como en la hemoglobinuria paroxística, sino que se comprende todo proceso de destrucción globular, sea por hemolisis propiamente tal, o por fragmentación globular o exceso de fagocitosis en el sistema retículo endotelial, llamado por Krumbhaar sistema hemolítico-poiético.

En este sentido, la hemolisis es un proceso fisiológico que mantiene el equilibrio sanguíneo entre la producción del glóbulo por el sistema hematopoiético, y alejamiento y destrucción a medida del desgaste de aquéllos por el sistema hemolítico-poiético. Entre este fenómeno fisiológico y su exageración, pasando por las crisis agudas o sub-agudas patológicas, condicionadas generalmente por agentes exógenos, hasta llegar a las formas crónicas condicionadas principalmente por factores endógenos o constitucionales, se encuentra toda una gama de síntomas o síndromas hemolíticos, que sólo en contados casos por sus caracteres uniformes clínicos y hematológicos y factores etiológicos constantes, permiten hablar de enfermedad propiamente tal.

Por ello y a fin de evitar repeticiones, no está de más recordar a los pediatras, ya que para los hematólogos son de-

masiado conocidos, ciertos conceptos etiológicos y patogénicos de la hemolisis patológica de la infancia.

La destrucción globular puede provenir de agentes externos hemolíticos, como ocurre en la gran mayoría de las formas agudas y sub-agudas del lactante. Puede tratarse de toxinas microbianas (sepsis, p. ej.) o daños alimento infecciosas en el lactante que conducen a excesiva fragmentación globular. Esas toxinas pueden actuar, además, por otro mecanismo que luego enumeraré. Protozoarios como la malaria (raro entre nosotros), agentes químicos entre los cuales debemos tener muy presente algunos medicamentos y entre ellos la sulfonamida. En mi trabajo ya citado sobre anemias de lactante, presento un recién nacido con crisis hemolítica y anemia consiguiente por sobre dosificación del primero a la madre. Cesó el trastorno con la suspensión momentánea de la lactancia. La acetanilida y también el tan usado a larga mano por las madres, la fenalgina, con la cual tuve una vez oportunidad de observar grave crisis hemolítica en un lactante de 17 días, al cual se le suministraba una tableta entera cada 3 horas. Los derivados fenólicos y entre ellos el sustituto o falsificación del aceite de almendras, el aceite de Mirbano o Nitrobenzol. En esta Sociedad de Pediatría se han presentado y discutido casos de esta intoxicación, venenos vegetales y animales. Finalmente y sobre todo hemolisinas formadas en el organismo del niño, como reacciones a antígenos externos, como en el caso de incompatibilidad sanguínea o auto formados como en la hemoglobinuria paroxística. A este respecto conviene tener presente que en muchos procesos de hemolisis se ha podido demostrar una fase previa de aglutinación, por la formación de aglutininas: iso o pan aglutinaciones, que dejan a los glóbulos en condiciones de ser destruidos en el bazo principalmente. Por ello se habla de reacción de tipo antígeno-anticuerpo y de hemolisis de tipo de cuerpos inmunizantes. Este fenómeno puede muy bien apreciarse en la hemolisis de la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Otro tanto ocurre en ciertas hemolisis agudas del lactante y niño del tipo llamado de Lederer por mecanismo alérgico o algo semejante.

Al lado de este mecanismo hemolítico por factores exógenos hemolíticos, tenemos un segundo mecanismo, dependiente de anomalías en la conformación o grado de desarrollo de los glóbulos rojos circulantes. Esta vulnerabilidad, para no decir fragilidad, por lo que después veremos, globular, puede deberse a factor constitucional, generalmente familiar y

hereditario, como ocurre en las enfermedades hemolíticas crónicas propiamente tales (anemia hemolítica familiar, mediterránea, falciforme, etc.).

Pero debemos declarar que este punto es debatido y en algunas de dichas afecciones existiría, según muchos, un daño sanguíneo y las características morfológicas anormales no serían sino la fase previa a la destrucción, que desaparece en algunos casos con la esplenectomía.

En otros casos, la vulnerabilidad globular no es congénita y se presenta por la gran cantidad de glóbulos circulantes inmaduros (eritroblastosis), como observamos en los estados de excitación medular del niño, sea por infecciones, o daños infecciosos alimenticios en el tan discutido síndrome de v. Jackch Hayem, o en las enfermedades con incarceration medular con focos hematopoiéticos metaplásicos y hasta en la eritroblastosis fetal, donde la gran destrucción globular por incompatibilidad sanguínea trae una fuerte reacción medular con lanzamiento a la circulación de glóbulos inmaduros destinados a la vez a su más pronta destrucción. Aquí ya nos encontramos con un doble mecanismo, a que arriba aludía, de la hemolisis frente a un mismo factor etiológico: a veces toxinas en el caso de infección destruyen los glóbulos y a la vez actúan sobre la médula, haciéndola producir glóbulos inmaduros, o bien se produce el fenómeno de hemolisis por reacción directa antígeno anticuerpo, como en la eritroblastosis con efectos parecidos de excitación de la médula.

Y finalmente me queda un tercer factor que recordar de destrucción globular: actividad excesiva hasta lo patológico del sistema hemolítico poiético y en primer término del bazo. Ya hacía notar las dudas que a muchos le merecen la patogenia de las enfermedades hemolíticas constitucionales, en cuanto causadas sólo por anomalías de los eritrocitos. Para esos autores, el factor principal residiría en el bazo, cuya actividad exagerada, sea por formación de hemolisinas o excesiva actividad fagocitaria, conduciría a la destrucción globular. Los brillantes resultados obtenidos en la esplenectomía en algunas de esas formas apoyaría esta manera de pensar.

Si me he extendido, aunque sea en forma excesivamente resumida sobre estos conceptos etiopatogénicos de la hemolisis patológica, lo creo justificado, porque ellos servirán para la interpretación diagnóstica y sobre todo terapéutica de los cuadros clínicos que brevemente analizaré.

Antes de entrar en esta materia, conviene recordar que el criterio clínico y hematológico de apreciación de la des-

trucción globular, no ha de basarse, como a menudo cree el médico práctico, en la prueba de la fragilidad globular. Hay enfermedades hemolíticas tal como la llamada anemia mediterránea, o la falciforme y muchas formas agudas, donde dicha resistencia, en vez de estar disminuída, se le encuentra elevada en relación con lo normal. El diagnóstico clínico ha de basarse en el conjunto de síntomas de esta índole y la ayuda hematológica; pero no darle valor diagnóstico general a una prueba que sólo la tiene en la anemia hemolítica familiar. Tal vez el mejor y más sencillo índice de destrucción globular es la bilirrubinemia (Van der Berg indirecto). En esta prueba también debemos ser críticos para relacionar la intensidad de la bilirrubinemia con el grado de destrucción globular y no olvidar que la primera está, además, condicionada por la capacidad hepática de eliminación de pigmentos, o sea, del funcionalismo hepático a menudo afectado en ciertas enfermedades hemolíticas por la anoxemia derivada de la misma anemia. Más adelante les mostraré una observación donde estos hechos se ponen de manifiesto y dificultan el diagnóstico.

Después de estas consideraciones generales, entraré a dividir para su estudio, los síndromas o enfermedades hemolíticas de la infancia en 2 grupos: 1º) los que se producen en el recién nacido y lactante; 2º) las formas que son comunes a diferentes edades de la infancia. Dentro de los grupos veremos las formas agudas y sub agudas; pero dejando las formas crónicas para su estudio en el segundo grupo, por cuanto sus características no ofrecen grandes diferencias o particularidades con el cambio de edad, salvo algunas que se harán resaltar.

1. La patología hemolítica del recién nacido está casi totalmente ocupada por el síndrome de eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, como tiende a designársela, derivada, según ya parece indiscutible, de la incompatibilidad sanguínea materno fetal. No debemos olvidar que también se presentan en el recién nacido, aunque con escasa frecuencia, síndromas hemolíticos eritroblásticos por acción infecciosa (sepsis, sífilis) y en casos de diabetes materna. En éstos faltan los antecedentes familiares y sobre todo la demostración de la incompatibilidad sanguínea. La eritroblastosis en el recién nacido y aun en el lactante (y con ello la hemólisis) es una reacción inespecífica a cualquiera noxa sanguínea.

No me extenderé a propósito de la eritroblastosis fetal sobre sus manifestaciones clínicas, etiología y patogenia y evolución de los conceptos sobre esta materia. Ya todo ello fué

motivo de una reunión conjunta de esta Sociedad de Pediatría y la de obstetricia en el año 1943, a la cual contribuyó también el Prof. Vaccaro, donde me cupo colaborar con un trabajo en que presenté un grupo de 6 parejas con 17 hijos afectados de eritroblastosis, en que se analizaban los aspectos mencionados. Entre esos casos figuraba el primero que fué diagnosticado en Chile, que se publicó en los Archivos Chilenos de Pediatría del año 1927. El tema es, por lo demás, bien conocido de todos Uds. En el cuadro N° 1 se resumen dichas observaciones. Allí puede observarse que de las 6 parejas nacieron 29 niños, de los cuales 17 sufrieron del síndrome de eritroblastosis y de éstos fallecieron 9. Quedaron 8 sobrevivientes y de éstos 2 afectados de secuelas de ictericia nuclear (Kern-Ikterus). En la primera pareja llama la atención que de los 14 hijos, 2 son Rh negativos, lo que hace suponer un padre Rh positivo heterozigoto. Con todo, estos 2 niños

CUADRO N° 1

Parejas	Nº total de hijos	Afectados del s. eritroblastosis fetal			Nº afectados por el s. de eritroblastosis	Factor Rh en los padres y sobrevivientes			
		Fallecidos	Sobreviviente			Padre	Madre	Sobrevivientes	
			Con secuelas (Kernicter.)	Sin secuelas				+	-
Nº 1	14	4	1	(3) (*)	6 (**)	+	—	7	2
Nº 2	4	2	1		1	No inves.	—	2	
Nº 3	5	(1)	1		3	+	—	4	
Nº 4	2		1		1	No investig.			
Nº 5	2	(1)	1			+	—	1	
Nº 6	2	1			1	+	—	No inves.	
6	29	7 (2)	2	3 (3)	12			14	2
Total no inves.									

(*) Las cifras entre paréntesis indican casos probables de eritroblastosis, porque presentaron los signos clínicos de esta grave afección; pero en los cuales no se practicaron exámenes hematológicos ni anátomo patológicos.

(**) De estos 6 niños, 1 falleció en la edad escolar de tifoidea y no se investigó en el grupo sanguíneo ni factor Rh.

sufrieron intensa y prolongada ictericia de recién nacidos. Por otra parte, varios partos posteriores a aquéllos en que nacieron niños con eritroblastosis, dieron a luz niños sin el síndrome, no obstante existir la incompatibilidad sanguínea.

Posteriormente a esa presentación hemos observado y estudiado 4 casos más en nuestro servicio hospitalario, de uno de los cuales expongo a continuación su observación clínica y protocolo anátomo patológico, por considerar de interés ciertas particularidades clínicas y anátomo patológicas.

R. S. ingresa al servicio el 28-VIII-1946, a las 48 horas de nacido. La madre ha tenido 11 embarazos, de los cuales 7 se han interrumpido por intervención, debido a emesis gravídica y 3 han sido abortos espontáneos. Durante el último embarazo, del cual nace el paciente, se investiga el antígeno Rh en los esposos y se encuentra el padre Rh positivo, madre negativa. Se decide interrumpir ese embarazo con la expectativa de aminorar los daños al feto, lo que se verifica el 24-VIII mediante operación cesárea. Se extrae un niño vivo, sexo femenino, de 1.930 kgr. de peso, de franco color icterico de la piel y mucosas. Respiración débil y superficial. Tendencia al enfriamiento.

Se practicó en la maternidad una transfusión de 20 cc. de sangre, grupo O Rh (—). Se deja en la incubadora con estimulantes, coramina, suero glucosado 100 grs. diarios por vía bucal.

Trasladado a las 48 horas a nuestro servicio, en estado muy grave, fallece antes de las 24 horas de permanencia en él.

En la sangre materna se comprobó después del parto la presencia de abundantes aglutininas anti Rh.

En la autopsia se comprueba, entre los hallazgos más importantes, coloración amarillenta de la piel y mucosas, edema subcutáneo generalizado. En el encéfalo intenso edema meníngeo y edema de la masa encefálica que se halla teñida de color amarillento. Hígado aumentado de tamaño, al corte edematoso y muy congestivo. Bazo pequeño.

Al estudio histológico se encuentra en el hígado la estructura trabecular conservada. Las células hepáticas se ven algo hinchadas y tumefactas. Entre las mallas hepáticas existen abundantes focos hematopoiéticos de células polimorfas, encontrándose toda clase de elementos sanguíneos inmaduros. Estos elementos no sólo están en focos, sino que también distribuidos difusamente, de tal manera que en todo el campo microscópico se observan abundantemente. También entre las mallas se ven depósitos pigmentarios (Ver fig. 1). Bazo: de estructura bien formada, notándose claramente los folículos linfáticos; en el resto los sinusoides están dilatados y entre ellos se ven focos celulares de tipo hematopoiético. Riñones: en algunos puntos del parénquima existen focos celulares polimorfos.

Este caso puede servir de ejemplo típico y resumen de las principales alteraciones que produce la eritroblastosis fe-

tal: ictericia precoz e intensa, que impregna los tegumentos, mucosas y vísceras, incluyendo la masa encefálica y meninges; edema generalizado externo y visceral; focos hematopoiéticos embrionarios en el hígado, bazo y riñones.

Se aprecia aquí, también, que la interrupción prematura del embarazo no libra al recién nacido de los efectos de la incompatibilidad materno infantil, a cuyos efectos se agrega la agravante de la prematuridad.

Fig. 1.

Corte histológico de hígado de R. S., donde pueden observarse numerosos focos hematopoiéticos entre los cordones celulares.

En la oportunidad arriba aludida, de la presentación sobre "eritroblastosis fetal", en la reunión conjunta de la Sociedad de Obstetricia y de Pediatría, hacía notar las fallas que la teoría de la incompatibilidad Rh encontraba al procurar aplicarla a todos los casos (análisis del cuadro) y recordaba algunas citas en la literatura que a ella se oponían, como los casos de Gallegher y otros, en que aparecía el síndrome en hijos de madres Rh positivas y no encontraba tampoco relación entre el título de anticuerpos maternos y la gravedad del cuadro del hijo. También Levine, Katzin Burnham

tenían observaciones de eritroblastosis fetales, donde no comprobaban incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo. Estos hechos y la falta de anemia inicial con eritroblastosis en algunos casos, el compromiso hepático demostrado histológicamente y la complicación tan peculiar de la afección, la ictericia nuclear (*Kernikterus* de Schmorl), decía: "son puntos oscuros que necesitan ser aclarados con mayor número de observaciones estudiadas desde el punto de vista de la

Fig. 2.

Esquema de Wiener para demostrar el mecanismo de aglutinación y bloqueo.

iso-inmunización". Ahora bien, muchos de estos puntos están siendo aclarados gracias al perfeccionamiento de los estudios hematológicos, que no sólo han dado un avance para precisar el diagnóstico casi en el 100 % de los casos de enfermedad hemolítica del recién nacido, sino para dictar, además, una conducta terapéutica.

En efecto, la falta de demostración de aglutininas en la madre frente a los glóbulos rojos del hijo, encuentra su explicación en el descubrimiento de otros mecanismos de hemólisis que entran en juego, aparte de la aglutinación de los glóbulos fetales por aglutininas anti Rh elaboradas por la madre. Estas aglutininas anti Rh serían, como otros antígenos, globulinas modificadas bivalentes, que al combinarse con los glóbulos rojos Rh positivo del hijo, producen la aglutinación (Fig. N° 2). Si en la prueba de investigación,

al juntar glóbulos rojos Rh positivos del hijo con el suero materno Rh negativo, no se produce aglutinación, se le agrega un suero potente anti Rh: al no existir aglutininas anti Rh en el suero del paciente, se produciría con el nuevo agregado inmediatamente la aglutinación. Pero si no se produce el fenómeno, ello indica la presencia de anticuerpos especiales en el suero del paciente, que impiden la aglutinación. Estos anticuerpos se combinan con los glóbulos rojos Rh positivo, sin dar lugar a la aglutinación visible; pero saturan sus valencias, que impiden la acción de potentes sueros aglutinantes anti Rh. Estos anticuerpos especiales son los llamados "anticuerpos bloqueantes", que son monovalentes y de menor tamaño molecular que las aglutininas bivalentes. Estos anticuerpos monovalentes por su menor tamaño molecular, pueden atravesar durante el embarazo la placenta en un período anterior que las aglutininas bivalentes y ejercen mayor tiempo sus efectos sobre el feto.

Así se explica que muchos niños eritroblásticos nacidos muertos, presentan esos cuerpos bloqueantes y sus glóbulos rojos no sean aglutinados in vitro por el suero materno. De allí también la mayor gravedad para el niño que encierra la presencia en la madre de los anticuerpos bloqueantes.

Existe todavía un tercer mecanismo de destrucción globular en el feto, en que no se produce directamente la aglutinación por aglutininas maternas: ello es el fenómeno de la conglutinación.

Este consiste en un proceso equivalente al de aglutinación; pero en esta última intervienen sólo dos factores: el antígeno (glóbulos rojos Rh (+)) y el anticuerpo bivalente (aglutininas anti Rh). En la conglutinación intervienen tres elementos, a saber: (véase cuadro N° 2) el antígeno (glóbulos rojos Rh (+)), un anticuerpo sensibilizante monovalente (aglutinina Rh) y un tercer factor que completa la reacción, el llamado por Wiener proteína X, coloide compuesto de

CUADRO N° 2.

Gl. r. Rh + (Antígeno Rh)	+	Aglut. Rh (Anticuerpo bivalente)		Aglutinación
Gl. Rh + (Antígeno Rh)	+	Glutin. Rh (Anticuerpo univalente)	+	Proteína X (conglutin.)
				Conglut.

Mecanismo de aglutinación y conglutinación según Wiener.

albúmina-globulina y fosfolípidos, el cual se halla presente en todos los sueros. Este último elemento se disocia en las soluciones salinas corrientes que se emplean en las pruebas de aglutinación, y de allí que cuando el mecanismo de aglutinación en un caso dado sea el aquí comentado, si se investigan las aglutininas anti Rh con soluciones salinas, para diluir el suero materno o los glóbulos rojos del niño, se obtengan resultados negativos. Para obviar esta dificultad y poner de manifiesto el mecanismo de conglutinación, debe procederse con suero sin diluir o usando como diluyente un suero A B inactivado, tanto para el suero como para los glóbulos rojos del paciente.

La naturaleza misma de los anticuerpos sensibilizantes monovalentes no es aún bien conocida, y se llega a suponer sean los anticuerpos monovalentes bloqueantes a que más arriba se aludía.

La existencia de estos nuevos mecanismos de aglutinación y hemolisis explica algunos vacíos que se observan en casos de eritroblastosis y que no se compadecen con los conocimientos anteriores sobre aglutinación. Así, algunos casos de eritroblastosis tardías y benignas en algunos recién nacidos encuentran su explicación en el hecho que la proteína X es de tardía formación en el feto, con lo cual los efectos de la incompatibilidad sanguínea materno fetal se ejerce por menor tiempo.

En los casos por mí estudiados no se han practicado estas pruebas ya universalmente conocidas y con ellas podría aclararse la aparente falta de demostración de incompatibilidad sanguínea en niños Rh positivo de madres Rh negativo.

Hay otros hechos interesantes que agregar sobre la biohematología de la eritroblastosis, tales como la predisposición constitucional de ciertas mujeres a elaborar aquellos anticuerpos (factor K); la presencia de otros antígenos más potentes que el Rh, como los factores A y B que inhiben la acción de los anticuerpos Rh, etc., sobre los cuales no quiero extenderme y se encuentran ampliamente expuestos en el trabajo de Wiener citado.

Basta decir, en resumen, que la variedad de manifestaciones de la enfermedad hemolítica congénita depende de la cantidad y calidad de anticuerpos en la madre, del grupo sanguíneo de ella y el niño (otras incompatibilidades aparte del Rh), de la presencia de aglutininas monovalentes que darían lugar a las formas tardías más benignas, o de aglutininas bivalentes que causarían las formas tóxicas con aglutinación rá-

pida y formación de trombos vasculares que conducen a las graves lesiones hepáticas y al Kernikterus.

Para dar lugar a esas diversas variedades y combinaciones, entrarían en juego, pues, factores maternos, del feto, del padre y factores accidentales. Sobre éstos quiero detenerme un momento.

Uno de los factores accidentales que con mayor frecuencia dan lugar a la formación de anticuerpos y a la sensibilización de la mujer Rh negativo es la transfusión sanguínea con sangre de dador Rh positivo. Producida esta sensibilización es posible que se le condene a que en el primer embarazo se produzca la eritroblastosis fenómeno que se sabe no es corriente. Aun más, hay casos comprobados en que una simple inyección de sangre intramuscular Rh positiva en una mujer Rh negativa, ha bastado para sensibilizarla. Estos hechos deben hacernos poner en guardia a los pediatras para no efectuar transfusiones o inyecciones de sangre a niñas sin previa determinación del tipo sanguíneo respecto al factor Rh y esto, a la vez, es una advertencia para el uso indiscriminado de las transfusiones sanguíneas o hemoterapia, de lo que tanto se abusa.

Y ahora, para terminar con el capítulo de la eritroblastosis fetal, algunas consideraciones terapéuticas derivadas de los últimos conocimientos adquiridos en esta materia. Para la prevención se había pensado que la interrupción precoz del embarazo por cesárea podía evitar la eritroblastosis del niño (Dr. Vaccaro también lo había preconizado). Desgraciadamente se sabe que la enfermedad puede empezar a desarrollarse en el feto antes de que éste sea viable al sacarlo del claustro materno, o bien, pueden presentarse las formas tardías por formación de proteínas X en el niño después de nacido. En tal caso se agrega a la enfermedad de eritroblastosis la complicación de tener un prematuro con todos los riesgos inherentes a su estado. Una vía que desde el punto de vista teórico sería recomendable, es la de inyectar a la madre embarazada en que se teme una eritroblastosis, y antes de que se produzca la sensibilización, un fuerte antígeno como vacuna anti-tífica o anti-coqueluche, antígeno que por su mayor poder frente al antígeno Rh, lo inhibe.

Otra investigación de interés para el pronóstico de un futuro embarazo es la determinación si el padre es Rh positivo homo o heterocigoto. En el primer caso las posibilidades son más pesimistas que en el segundo. Esta determinación se practica en la sangre del padre con suero Rh 2: si

es negativa, homocigoto; si positiva, heterocigoto (observaciones arriba citadas).

Como recursos terapéuticos para el recién nacido eritroblástico, lo que mejor resultados da es la transfusión de glóbulos rojos concentrados y lavados, que pueden ser aún de la madre (escasa cantidad de anticuerpos pasivos en el niño), en cantidad equivalente a 150 c.c. de sangre. El criterio para estas transfusiones ha de guiarse exclusivamente por la baja de la Hb. del niño, siendo inútil transfundir cuando hay cifras sobre 80 %.

Otro hecho de interés es la inferioridad de los efectos de la sangre de banco, siendo preferible la sangre fresca para los efectos de combatir la eritroblastosis del niño.

Otras enfermedades hemolíticas del recién nacido son de importancia menor y son casi siempre secundarias a otros procesos. Ya me referí a ellas al comenzar este capítulo: eritroblastosis en sepsis, sífilis, hijos de diabéticos y la enfermedad de Winckel hoy día cada vez más rara. En todos estos casos es preciso agotar los medios de diagnóstico de la enfermedad causal y excluir con los recursos mencionados la eritroblastosis fetal.

Formas agudas y sub agudas del lactante: A esta edad encontramos a veces episodios hemolíticos agudos secundarios a infecciones o intoxicaciones. Algunos casos de este tipo, especialmente derivados de procesos infecciosos agudos, se les incluye en la literatura en un síndrome hemolítico agudo, denominado "síndrome de Lederer". Cuadro clínico de comienzo agudo, en parte semejante al shock post transfusional, seguido a veces de hemoglobinuria. En realidad, muchos de los casos descritos en la literatura corresponden a crisis hemolíticas por infecciones (el origen infeccioso es la hipótesis de Lederer) o a intoxicaciones medicamentosas. shock alérgico (favismo) o algunos pertenecerían a episodios agudos de la forma de ictericia hemolítica adquirida, según Damaske y Schwartz, quienes hacen un detenido estudio del síndrome y proponen para su tratamiento la esplenectomía. Como se ve, no puede hablarse de un síndrome bien definido. Personalmente no he observado casos de esta naturaleza que no puedan encuadrarse dentro de síndromes hemolíticos agudos secundarios a infecciones o intoxicaciones.

Cooley declara que tampoco tiene experiencia en su clínica sobre este síndrome, aparte de la eritroblastosis fetal o reacciones post transfusionales, y se refiere a formas sub

agudas que podrían encuadrarse en síndromas equivalentes a la forma hemolítica eritroblástica denominada de v. Jacksch o formas perniciosiformes del niño a que me refiero más adelante.

En el lactante y niño menor no es raro encontrar reacciones hematopoiéticas de anemia hiperchroma macrocítica acompañadas de cierto grado de hemólisis que erróneamente podrían etiquetarse de formas perniciosas. La típica anemia de Biermer podemos decir que prácticamente no se presenta en la infancia. En estos casos entran siempre en juego, como factores etiológicos, daños infecciosos o tóxicos en un terreno constitucional del sistema hematopoiético, a veces con tendencia a la hemólisis. En el ejemplo siguiente existe un daño hepático previo, hepatitis infecciosa, en que a continuación se desarrolla anemia intensa con caracteres hemolíticos y de forma macrocítica hiperchroma. La historia clínica es la siguiente:

D. A.

Enfermedad actual. — Niño que consulta en setiembre de 1945, a la edad de 2 años 10 meses, por un cuadro con vómitos, fiebre, anorexia, y luego después ictericia, síntomas que habían comenzado pocos días antes de la consulta.

Antecedentes familiares. — Como único dato de interés se menciona una esplenomegalia intensa a los 5 meses de edad. Una anemia a los 11 meses.

En el servicio se comprueba niño icterico con esplenomegalia, orina oscura, deposiciones más bien blanquecinas. El hemograma en ese tiempo dió una anemia de 2.020.000 con 7 grs. % de Hb. y 6.600 glóbulos blancos. Anisopoiquilocitosis, microcitosis, escasos eritroblastos. La orina dió urobilina abundante. Las pruebas de funcionalismo hepático revelaban una insuficiencia. La resistencia globular máxima fué de 3.5 y la mínima de 4.5.

Se trató con régimen adecuado y 3 transfusiones de 100 c.c. cada una. Se dió de alta con el diagnóstico de hepatitis icterigena con persistencia de sub ictericia, la cual persistió hasta su reingreso 2½ meses después.

Reingresa en enero de 1946 con una ictericia muy intensa con gran compromiso del estado general. Hígado a 4 cms. del reborde, bazo se palpa en el reborde. A los pocos días la ictericia fué regresando, pero ha persistido hasta la fecha con discretas variaciones de intensidad. La bilirrubinemia siempre ha estado en cifras sobre lo normal, con una máxima de 237 mgrs. o/oo al ingreso y un mínimo de 9 mgrs.; actualmente 18 mgrs. El hígado se ha palpado siempre aumentado de tamaño entre 2 y 4 cms. por debajo del reborde costal. El bazo, palpable al comienzo, se redujo luego de tamaño, palpándose ahora a 4 cms. del reborde. Los exámenes de orina sucesivos han indicado siempre urobilina abundante y ocasionalmente pigmentos y sales biliares. Las

pruebas funcionales de suficiencia hepática han sido alteradas. Hanger +++, Takata Ara +++. El sondaje duodenal fué normal. La reacción de Van der Bergh ha dado reacción indirecta ligeramente positiva y directa positiva franca. La resistencia globular al comienzo normal, en los últimos exámenes ha dado cifras ligeramente alteradas, revelando cierta fragilidad globular.

Junto con la ictericia, lo que más ha llamado la atención en el niño es su anemia, que ha persistido durante todo el tiempo de su hospitalización entre cifras de 1.920,000 y 3.050,000 con Hb reducida entre 6,4 y 9,9 grs. % (ver cuadro N° 3). El estudio completo del hemograma ha revelado de que se trata de una anemia macrocítica (ver cuadro N° 3). El estudio sanguíneo del padre y madre no reveló alteración alguna. Un mielograma practicado el 21 de octubre de 1946 fué normal, con intensa reticulocitosis.

Al comienzo se trató con enemas de suero glucosado. Posteriormente con preparados inyectables de extracto hepático y complejo de vitamina B (Hiparon, Precitol, Tonopron). Ultimamente, con extracto hepático muy concentrado, Reticulogen Lilly. Se empleó $\frac{1}{2}$ c.c. durante 3 días seguidos y luego 3 inyecciones más con una semana de intervalo entre cada inyección. Con esto se obtuvo un aumento de los reticulocitos desde un 7 % hasta 37 %, pero no obtuvo un alza favorable en el número de los glóbulos rojos ni de la hemoglobina.

CUADRO N° 3.

Daniel A.—Observ. 45/4196.

Segunda hospitalización.

1-X-45	7-II-46	6-VI-46
G. rojos ... 2.020,000	Gl. rojos ... 2.540,000	Gl. rojos ... 1.920,000
Gl. blancos ... 6,600	Gl. blancos ... 8,600	Gl. blancos ... 6,400
Hb. ... 7	Hb. ... 8,5	Hb. ... 6,4
Bas. ... 0	Bas. ... 0	Bas. ... 0
Eos. ... 2	Eos. ... 1	Eos. ... 0
Mielo. ... 1	Mielo. ... 0	Mielo. ... 0
Juv. ... 1	Juv. ... 1	Juv. ... 0
Bac. ... 7	Bac. ... 3	Bac. ... 4
Seg. ... 37	Seg. ... 54	Seg. ... 60
Linfo. ... 49	Linfo. ... 68	Linfo. ... 30
Mono. ... 3	Mono. ... 3	Mono. ... 6

Aniso-macro poikilocitosis policromatofilia de regular intensidad. Anisocromía. Escasos eritroblastos.

6-X-45

Bilirubinemia ... 7 mgrs.

24-X-45

Resistencia globular:

mínima ... 4,5

máxima ... 3,5

Anisomacrocitosis marcada. Escasos poikilocitos policromatofilia de escasa intensidad. Regular cantidad de microcitos, Macrocytes hiperocrómicos.

16-I-46

Bilirubinemia:
237 mgrs. o/oo.

Anisocitosis mediana, poikilocitos. Oligocromía. Policromasia.

5-VI-46

Bilirubinemia:

12 mgrs. o/oo.

15-VII-46

Resistencia globular:

mínima ... 5,75

máxima ... 3,50

5-IX-46

Gl. rojos	2.210,000
Gl. blancos	10,800
Hb.	8,4
Bas.	0
Eos.	5
Mielo.	0
Juv.	0
Bac.	1
Seg.	55
Linfo.	36
Mono.	3
Valor globular	1,4
Vol. hematies	114
Anisocitosis con predominio de macro. Hiperchromia en relación al número de hematies. Ortocromia o ligera hipocromia en relación al volumen de los hematies.	

27-VIII-46

Bilirubinemia: 15 mgrs. o/oo.

5-IX-46

Resistencia globular:

mínima	5,25
máxima	3,25

15-X-46

Gl. rojos	2.570,000
Gl. blancos	7,200
Hb.	8,4
Bas.	0
Eos.	9
Mielo.	0
Juv.	0
Bac.	4
Seg.	24
Linfo.	59
Mono.	5

Anisocitosis con macro y microcitosis. Oligocromemia. Policromasia.

Reticulocitos: 16 %.

21-X-46

Bilirubinemia: 18 mgrs. o/oo.

26-X-46

Resistencia globular:

mínima	5,75
máxima	3,50

7-X-46

Gl. rojos	2.550,000
Gl. blancos	7,300
Hb.	8
Bas.	1
Eos.	4
Mielo.	0
Juv.	0
Bac.	2
Seg.	54
Linfo.	37
Mono.	2

Anisocitosis de regular intensidad. Escasos macrocitos normocrómicos. Escasos microcitos. Escasos poiquilocitos.

Reticulocitos: 7 %.

21-X-46

Gl. rojos	2.050,000
Gl. blancos	8,600
Hb.	8
Bas.	0
Eos.	4
Mielo.	0
Juv.	0
Bac.	9
Seg.	43
Linfo.	39
Mono.	5

Anisocitosis con macro y microcitosis. Poiquilocitosis. Oligocromia. Policromasia. Normoblastos 2 %.

Reticulocitos: 37 %.

Aquí puede verse que a raíz de una hepatitis aguda y prolongada, en que las pruebas funcionales hepáticas durante un tiempo, revelan el mal funcionalismo de ese órgano, se sigue una anemia tipo hipercroma y macrocítica (ver cuadros). Tratada esa anemia con extracto anti anémico Reticulógeno de Lilly, se aprecia intensa regeneración, la cual ya de antemano existía en menor grado (reticulocitosis hasta 7 %), lo cual no se observa en la anemia Biermer. Por lo demás, tampoco el niño ha presentado aquilia (examen jugo gástrico normal) ni otros síntomas de ese síndrome. La anemia tampoco se corrige, a pesar de la regeneración. En cambio, durante toda su evolución revela una alta bilirrubinemia, que se mantiene no obstante la normalización completa de las pruebas funcionales hepáticas. Esa bilirrubinemia, con sub ictericia, esplenomegalia y hepatomegalia, unidas a la anemia dicha con cuadro regenerativo, nos inclinan a pensar en una forma hemolítica adquirida, por cuanto no se encuentran antecedentes familiares de dicha enfermedad. Después volveremos sobre la forma familiar o adquirida de la ictericia o anemia hemolítica.

El otro síndrome hemolítico eritroblástico del lactante y niño menor que me cupo analizar frente a varias observaciones presentadas en el trabajo sobre 'Anemias del lactante' ya citado, es el llamado síndrome de anemia esplénica o síndrome de v. Jackch Hayem. La anemia se acompaña en estos casos de hemolisis con destrucción de glóbulos rojos inmaduros (eritroblastos), que siempre están presentes, unido todo ello a una fuerte reacción del sistema blanco, que adquiere, a veces, caracteres leucémicos (de allí el nombre pseudo leucémico), con hepato y esplenomegalia a veces considerable. Este síndrome se produce a consecuencia de daños infecciosos y nutritivos, que no tienen nada de específico y que afectan a niños con predisposición constitucional del sistema hematopoiético (Naegeli, Baar y Stransky). El pronóstico es, por lo general, favorable, con un buen tratamiento higiénico dietético y la ayuda de transfusiones. A veces puede tardar varios meses en regresar, sobre todo la esplenomegalia. El cuadro hemático alterado, según Naegeli, puede persistir años. El factor constitucional se demuestra por esta reacción tan especial en ciertos niños, siendo que son muchos los que están sometidos a los mismos daños infecciosos y dietéticos, como en nuestro medio, y pocos los que presentan el síndrome. Esto se confirma con la opinión de muchos investigadores, entre otros Fanceni, que cree ver en este síndrome simplemente una

forma de la anemia mediterránea, afección hemolítica eminentemente constitucional.

Pero nosotros, en los casos que hemos observado, no hemos podido confirmar esa opinión de Fanconi, por cuanto faltan muchas de las características clínicas, sistema óseo entre otros y hematológicas, caracteres de los glóbulos, etc.

En las 2 observaciones siguientes se puede apreciar la evolución favorable del síndrome, no obstante la gravedad de sus síntomas iniciales.

C. T.—Nació el 5-X-41. Consulta en Policlínica a los 5 meses de edad, el 27-III-42. Primer hijo. Parto normal de término (?). Peso de nacimiento: 2.250 kgrs.

Al seno exclusivo 2 meses. Luego complemento con 2 x 120 grs. leche 2/3. No hay enfermedades anteriores.

Consulta por fiebre de hace más o menos una semana y transpiraciones.

Examen físico. — Peso: 6.800 kgrs. Buen estado nutritivo. Tórax ensanchado. Rosario costal. Algunos estertores. Hígado a 2 traveses.

Diagnóstico. — Bronquitis. Raquitismo.

21-IX-42. — Peso: 8.300 kgrs. Vuelve a consultar por' diarrea. Se comprueba abdomen abultado con circulación colateral. Hígado a 4 traveses. Bazo a 3 traveses.

Hemograma. — Glóbulos rojos: 2.900.000; glóbulos blancos: 11.600; Hb.: 6.6 grs. %; E.: 2; Miel.: 0; Juv.: 4; Bac.: 8; Seg.: 15; Linf.: 65; Mon.: 6.

Primera hospitalización — 1-X-42: Peso: 7.890 kgrs. Febril: 38,5°-38° por 15 días, declinando en lisis, para seguir sub febril 37½ hasta 38°, ocasionalmente por 3 meses, en que se hace afebril.

Examen físico. — Abatido, muy pálido, indiferente. Fenómenos catarrales bronquiales. Hígado y bazo grandes, éste a 30 cms. del reborde. R. W.: (—). Tuberculinas: (—). V. der Berg: (—). Bilirubinemia 1.5 mgr. o/oo. Hemocultivos: (—). Hemograma: glóbulos rojos: 2.930.000; glóbulos blancos: 9.100 (no hay fórmula diferencial); Hb.: 8.4 grs. %; hematocrito: 29.1 %; índice de color: 1.03. El 8-X (después de 2 transfusiones): glóbulos rojos: 3.400.000; Hb.: 9 grs. %; glóbulos blancos: 5.00; Eos.: 7; Juv.: 6; Bac.: 1; Seg.: 16; Linf.: 37; Mon.: 12.

Tratamiento — 4 transfusiones de 100 c.c. cada una.

16-X. — Hemograma: glóbulos rojos: 5.500; glóbulos blancos: 11.200; Hb.: 15.8 grs. %; Bac.: 15; Seg.: 34; Linf.: 36; Mon.: 25.

23-X. — Varicela: Peso: 8.300 kgrs.

Alimentación completa todo el tiempo.

2-XII. — Hemograma: glóbulos rojos: 4.050.000; glóbulos blancos: 17.600; Hb.: 9.5 grs. %; Miel.: 2; Juv.: 4; Bac.: 21; Seg.: 36; Linf.: 26; Mon.: 11. Resistencia globular: (4—3,75).

El 10-X se aprecia reducción considerable del bazo. Hígado a 3 cms. Piuria en I-43. Hemograma se mantiene en condiciones semejantes.

Salé de alta el 14-I-43 a lo 15 meses de edad, con bronquitis aguda, piuria y otitis media bilateral. Peso: 7,600 kgrs.

Hemograma: glóbulos rojos: 3 300.000; glóbulos blancos: 20.000; Hb.: 9 grs. % con Miel.: 1; Juv.: 1; Bac.: 17; Seg.: 40; Linf.: 34; Mon.: 7. Bazo e hígado muy aumentados de tamaño. Recibe una serie de 5 transfusiones.

10-III-43. — Peso: 8.100 kgrs. Continúa con tos, que adquiere carácter coqueluchoideo.

29-III. — Nuevas atazas febriles lo hacen bajar a 7.140 kgrs. Con las transfusiones, el hemograma cambia a: glóbulos rojos: 4.280.000; glóbulos blancos: 19.600; Hb.: 13 grs. %. Persiste el aumento del hígado y bazo. Coqueluche.

Permanece en el servicio, donde es tratado con régimen dietético, de acuerdo con sus alteraciones digestivas, para llevarlo a un régimen completo, tomando en cuenta su edad de 18 meses, con medio litro de leche, carne, huevos, frutas, puré de verduras, vitamina D y complejo B extra.

En su segunda estada en el hospital, que dura 7 meses, recibe, además, 22 transfusiones, con un total de 1.940 grs. de sangre.

El estado general mejora, alcanzando un peso de 9.500 kgrs. a los 22 meses de edad, cuando es dado de alta el 23-IX-43.

Los hemogramas oscilaron en forma semejante a los expuestos, para irse normalizando gradualmente.

	7-VI	3-VII	24-VII	13-VIII
Glóbulos rojos	3.860.000	3.040.000	4.150.000	5.940.000
Glóbulos blancos	17.400	15.700	17.500	15.900
Hb.	10 grs. %	9.5 grs. %	13 grs. %	17.5 grs. %
Eos.	2	1	1	6
Juv.	1	0	0	0
Bac.	19	8	14	12
Seg.	44	52	54	41
Linf.	36	35	30	39
Mon.	4	4	1	2

Después de alta sigue controlado en Policlínica hasta los 4 años de edad, donde se aprecia la reducción paulatina del bazo y el hígado con un desarrollo físico satisfactorio.

En resumen: niño prematuro (2.250 kgrs. al nacer), con disergia, a consecuencia de la cual sufre repetidas infecciones desde los primeros meses. Alimentación artificial desde los 2 meses. Raquitismo. Al comienzo del 2º semestre se aprecia ya hepato y esplenomegalia, acompañadas de anemia persistente y rebelde que se agrava con los brotes infecciosos, corrigiéndose momentáneamente mediante transfusiones. Este estado persiste hasta los 22 meses, en

que ya se aprecia la mejoría acentuada y progresiva de la anemia y desaparición de la esplenomegalia.

P. B.—Ingresó con 10 días de edad el 30-I-42, con peso de 3.020 kgrs., con diagnóstico de sepsis. Recibió transfusiones sanguíneas y se alimentó con leche humana, con lo cual mejoraron sus alteraciones.

Al mes de edad sufre infecciones respiratorias superiores: faringitis y otitis en varias ocasiones. En esta época ya se comprueba hepato y esplenomegalia. Hemograma normal con 5,2 millones de glóbulos rojos, 8,200 glóbulos blancos, 100 % Hb.

Como alimentación recibió leche humana los primeros 15 días y después leche maternizada SMA durante 5 meses.

A los 3 meses de edad, con peso de 4.580 kgrs., llama la atención intensa palidez cérea, con ligero tinte amarillento de la piel y mucosas. Hepato y esplenomegalia considerable. Hemograma: glóbulos rojos: 1.230.000; glóbulos blancos, 8.400; Hb.: 4,8 grs. %; Bac.: 0; Eos.: 0; Miel.: 2; Juv.: 2; Bac.: 5; Seg.: 10; Linf.: 75; Mon.: 6; 1 célula plasmática; 1 linfoblasto.

Se le practica una serie de transfusiones y se corrige su régimen dietético, pasándolo a fórmulas con leche de vaca fresca. El estado general comienza a mejorar gradualmente, como también su fórmula sanguínea, que puede apreciarse en el siguiente cuadro:

	4 meses	5 meses	7 meses	9 meses
Glóbulos rojos . . .	2.140.000	2.750.000	3.672.000	4.000.000
Glóbulos blancos . .	6.800	8.400	10.800	7.800
Hb.	5,88 grs. %	8,64 grs. %	10,7 grs. %	14 grs. %
Bac.	0	0	0	0
Eos.	0	2	0	0
Miel.	0	0	0	0
Juv.	0	0	0	1
Bac.	1	2	1	17
Seg.	7	10	9	22
Linf.	38	79	75	55
Mon.	6	7	15	5
Hemates nucleados			Anisocitosis	
Algunos eritroblastos			Poiquilocitosis	
			Eritroblastos	
			Normoblastos	

La inmunidad fué mejorando, disminuyendo las infecciones. Con ello su desarrollo siguió un curso normal, alcanzando a los 9 meses con un peso de 7.710 kgrs.

La hepato y esplenomegalia se redujeron; pero eran aún ligeramente perceptibles a esa edad.

En estos dos casos se presenta completo el síndrome clínico de anemia esplénica, o pseudo-leucémica de v. Jacksch-

Hayem, con sus características hematológicas. En ambos, con un prolongado régimen higiénico-dietético, ayudado de transfusiones, se obtuvo la mejoría en algunos meses. En ambos se nota la acción desencadenante del síndrome, de las infecciones y daños nutritivos, notándose especialmente en el primero la predisposición a la reacción esplénica desde la edad de un mes.

En cambio, en el caso siguiente tenemos una forma más grave y rebelde, que simula durante cierto tiempo una leucemia; pero, que ya en período de franca mejoría contrae una grave infección intercurrente, que lo lleva a la muerte.

El estudio anátomo patológico e histológico de las vísceras es de especial interés en los tiempos actuales, en que cada día es más raro este síndrome con evolución fatal.

Fig. 3.

Protocolo 44/2390 de M. M.

M. M.—Consulta a los 3½ meses de edad en la Policlínica, por una hernia inguinal.

Antecedentes hereditarios. — No tienen imporrancia.

Antecedentes personales. — Nació en parto de término y pesó 2.800 kgrs. Alimentación materna por 10 días, después artificial con leche de vaca desecada.

En el examen físico se deja constancia de un hígado que se palpa a 3 cms. bajo el reborde costal. Bazo palpable. Peso: 4.600 kgrs.

Durante 3 meses de observación en la Policlínica se caracterizó por sufrir frecuentes infecciones respiratorias, piodermis y trastornos nutritivos (dispepsia). Presentó también signos de raquitismo y se trató con vitamina D2.

A los 6½ meses pesaba 5.150 kgrs. A esta edad presenta abdomen globuloso, hígado aumentado de volumen a 2 traveses de dedo del reborde costal. Bazo constituido por una enorme masa de forma ovoidea, que ocupa la mitad del abdomen izquierdo, bajando hasta la fosa iliaca. En estas condiciones se hospitaliza.

A su ingreso el examen físico confirma los hallazgos en la Policlínica. El aspecto del niño y caracteres del bazo se aprecian en la fotografía fig. 3.

No se aprecian signos raquíticos ni otras alteraciones viscerales que las mencionadas. Reacciones tuberculinicas negativas. Kahn y Kline (—). Radioscopia de tórax normal. Radiografías óseas no revelan alteraciones patológicas. Reacción de Van der Bergh: 37.5 mgrs. o/oo.

23-I-45: Hemograma. — Glóbulos rojos: 2.750.000; glóbulos blancos: 63.100; Bas.: 0; Eos.: 5; Mon.: 0; Juc.: 5; Bac.: 16.5; Seg.: 31.5; Linf.: 33.5; Anisocitos's, poiquilocitosis. Hay eritroblastos y algunos linfoblastos.

Evolución. — El período de hospitalización se caracterizó por las frecuentes infecciones intercurrentes: rino faringitis, vulvitis, piodermas, enterocolitis. Una vez hepatitis aguda con ictericia. Bronconeumonía.

En dos oportunidades recibió una serie de 5 transfusiones. Las infecciones se combatieron con suministro de sulfas. En una oportunidad recibió también una cura de penicilina que, junto con dominar las infecciones, se notó a raíz de ella una notable normalización de la fórmula sanguínea, como puede apreciarse más abajo, sobre todo en la fórmula que simula leucemia.

Hemogramas:

Cura de penicilina (V-VII-45)

25-II-45		15-V-45	
Glóbulos rojos	3.640.000	Glóbulos rojos	2.850.000
Glóbulos blancos	31.600	Glóbulos blancos	16.300
Hb.	11 grs.	Hb.	10,5 grs.
Bas.	0	Mielobl.	2
Eos.	2	Prom.	1
Miel.	0	Miel. eos.	1
Juv.	6	Miel. juv.	4
Bac.	14	Juv. eos.	1
Seg.	30	Juv.	5
Linf.	40	Bac.	1
Mon.	8	Eos.	3
		Bas.	4
		Seg.	17
		Linf.	57
		Linf. bl.	1
		Mon.	3
		Monoblas.	2

10-VIII-45		XI-45	
Glóbulos rojos	3.670.000	Glóbulos rojos	3.670.000
Glóbulos blancos	8.700	Glóbulos blancos	10.900
Hb.	10,8 grs.	Hb.	10,3 grs.
Bas.	0	Bas.	0
Eos.	4	Eos.	0
Miel.	0	Miel.	1
Juv.	0	Juv.	9
Bac.	16	Bac.	13
Seg.	22	Seg.	24
Linf.	50	Linf.	40
Mon.	8	Mon.	6
No hay eritroblastos.		Escasos eritroblastos.	
		1 promielocito.	

Mielograma (VII-45)

Hemohistoblastos	0,5	Bac. neutr.	6,5
Hemocitoblastos	0	Bac. eos.	2,5
Mieloblastos	0,5	Segm. neutr.	0,5
Pro-mielocitos neutr.	2	Segm. bas.	0
Pro-mielocitos eos.	0,5	Segm. eos.	0
Mielocitos neutr.	12,5	Linfoblastos	2,5
Juv. neutr.	16	Prolinf.	1,5
Juv. eos.	1	Linf.	44
		Monoc.	1,5
		Eritrobl. bas.	3
		Eritr. polierom.	4,5
		Eritr. ortoci.	0,5
		Megacariocito	0

Esplenograma (VIII-45)

Hemohistobl.	1	Bas.	0,3
Hemocitobl.	1,3	Linf.	0,66
Mielobl.	3,3	Prolinf.	5,66
Promielobl.	3,3	Linf. grandes	0
Miel. neutr.	3	Linf. normal	4,66
Miel. neutro	2	Mon.	3,66
Juv. neutr.	4	Türch	0,33
Juv. eos.	0,33	Plasmaz.	0,66
Bac. neutro	11	Eritrobl. bas.	25,66
Bac. eos.	0	Proeritrobl.	0,66
Seg. neutr.	6		
Seg. eos.	0,3		

Estuvo hospitalizado durante 12 meses. El desarrollo se verificó en forma gradual y continua, alcanzando un peso de 8.200 kgs. a los 19 meses. Conservó siempre buen ánimo, su desarrollo psíquico se hizo en condiciones normales, decayendo sólo durante los periodos febriles de las infecciones, las cuales fueron distanciándose cada vez más. Siempre se alimentó bien y tuvo buena tolerancia nutritiva.

El bazo se conservó todo el tiempo aumentado enormemente de volumen, teniendo ligeras remisiones, en las cuales se apreciaba de consistencia más blanda.

A los 19 meses contrajo una bronconeumonía de carácter séptico-tóxica, que no cedió al tratamiento de sulfadiazina, falleciendo antes de las 48 horas de iniciado.

Autopsia. — Los datos principales de ella dicen:

Encéfalo: pequeñas hemorragias meníngeas sub aracnoides.

Pulmones: ambos pulmones cicátricos e indurados por presencia de múltiples focos bronconeumónicos confluentes.

Cavidad abdominal: extraordinario desarrollo del bazo, que mide 17 cms. de largo, 9 de ancho y 5 de grosor. Pesó 350 grs. Cápsula engrosada. Consistencia firme al corte.

Hígado: ligeramente aumentado de tamaño. Pesó 55 grs.

Mesenterio: discreta hiperplasia de los ganglios.

Médula ósea: en los huesos largos de color rosado pálido.

Informe histológico. — Epífisis ósea con estructura óseo cartilaginosa normal.

Médula ósea: constituida por abundantes elementos celulares muy conglomerados, entre los que se aprecian algunos megacariocitos y variados elementos inmaduros de la serie mieloide.

Bazo: estructura conservada, con gran hiperplasia de la pulpa roja y discreta de la pulpa blanca.

Hígado: hiperbémico con abundantes infiltrados circunscritos de tejido hematopoiético, el que está formado por malla de tejido conectivo reticular, en el que se ven células polimorfas, la mayoría de gran núcleo e intensamente teñidas (ver figuras 4 y 5).

Riñones: se encuentran infiltrados semejantes a los del hígado; pero en menor cantidad.

Ganglios linfáticos: hiperplasia de sus nódulos.

La discusión diagnóstica de este caso ofrecía serias dificultades en un principio. La enorme esplenomegalia, unida a un hemograma con caracteres leucémicos (63,300 glóbulos blancos, con formas embrionarias), podía hacer pensar en leucemia. Pero tanto la evolución clínica, la mejoría del estado general, las oscilaciones del hemograma con períodos de casi normalidad, hicieron descartar tal diagnóstico, que se inclinó definitivamente a un síndrome de v. Jacksch. A esto apoyaba la fórmula sanguínea con la anemia persistente, de tipo hemolítico eritroblástico (bilirrubinemia de 37,5 %), todo ello unido a los antecedentes infecciosos respectivos y la evolución clínica.

La autopsia confirma dicho diagnóstico con los hallazgos de focos múltiples de metaplasia mieloide en el hígado y

Protocolo 42/46 de M. M. Corte histológico de bígado, donde se observan focos de tejido hematopoyético en actividad.

Fig. 5.

Fig. 4.
Protocolo 42/46 de M. M. Bazo con numerosos focos hematopoyéticos en actividad.

riñones, lo cual es confirmado por los estudios de anatómo patólogos y clínicos como Morawitz y Seyferth, Naegeli, Baar y Stransbay.

En este caso puede muy bien apreciarse como bajo el estímulo de noxas infecciosas, el aparato hematopoiético en ciertos casos de lactantes reacciona en forma embrionaria, tanto en la serie roja (eritroblastosis) como en la serie blanca (pseudo leucemia: elementos embrionarios de la serie mielóide y linfoide, esplenomegalia).

Tenemos, pues, en resumen, un síndrome hemolítico de carácter sub agudo, que no constituye propiamente una enfermedad, por no corresponder a una etiología específica, sino que representa una reacción especial de ciertos niños con una labilidad constitucional del sistema hematopoiético frente a noxas infecciosas o tóxicas derivadas de higiene y dietética defectuosas.

2) Nos queda aún por considerar el grupo de enfermedades hemolíticas propiamente tales, las enfermedades hemolíticas familiares o constitucionales: la anemia o ictericia hemolítica familiar, la anemia mediterránea y la anemia de cels. falciformes. Seré muy breve y no me detendré a describir estos cuadros clínicos, por ser demasiado conocidos y porque no dispongo en nuestro material clínico de observaciones sobre ellos, fuera de algunos casos de anemia hemolítica familiar. De anemia mediterránea y de la de cels. falciformes no he visto ninguna que satisfaga todas las exigencias clínicas y hematológicas, ni ha sido descrito en nuestro país ningún caso; pero es mi impresión de que tales formas deben encontrarse y que es necesario buscarlas sobre todo por parte de los hematólogos, con mayor intensidad y con el empleo de las técnicas adecuadas.

Sobre ictericia hemolítica familiar puedo presentarles un ejemplo, en que tuvo su primera crisis hemolítica ya en el período de recién nacido. Este hecho no es común, pues, por lo general, las crisis hemolíticas aparecen en época más tardía. Su manifestación temprana puede dar lugar a dificultades diagnósticas, confundiendo tales casos con la eritroblastosis fetal o más tarde hacer considerar esas crisis como variedades de la forma aguda llamada de Lederer. En nuestro caso los antecedentes familiares y la evolución posterior permitían afirmar el diagnóstico ya dicho.

Conviene recordar respecto a esta afección en el niño que, cuando presenta sus manifestaciones ya en la edad del lactante, ofrece ciertas particularidades: en esta edad la ictericia puede

ser muy moderada o faltar, no obstante la existencia de hemolisis (poder de eliminación de células hepáticas). Puede también faltar la esferocitosis y microcitosis tan características de la afección en el niño mayor y adulto, debido a la reacción macrótica tan común en el lactante frente a toda acción anemizante.

En el diagnóstico diferencial no debemos olvidar las formas adquiridas, en las cuales faltan los antecedentes familiares y que pueden interpretarse como mutaciones bruscas, que dan lugar a dichas formas. En ellas el diagnóstico se dificulta porque suelen faltar ciertos caracteres hematológicos, como la esferocitosis y el aumento de fragilidad globular. Muchos de estos casos vistos por primera vez en sus crisis, suelen ser etiquetados como anemias agudas de Lederer.

El interés que tiene el reconocer estos casos adquiridos, es que ante la rebeldía de los tratamientos, debe plantearse la terapéutica por esplenectomía, que suele dar tan buenos resultados como en la forma familiar congénita.

Otro aspecto que debemos tener presente en el diagnóstico diferencial en el niño, es el de las reacciones perniciosiformes a que aludía más arriba, acompañados de reacción hemolítica y que a veces corresponden a formas adquiridas de la ictericia o anemia hemolítica. El caso que les presenté hace un momento pone de manifiesto dicha dificultad diagnóstica.

Respecto a la anemia mediterránea, no puedo presentarles observaciones. Me limito sólo a llamar la atención de los hematólogos que trabajan en servicios de niños para aguzar los medios de investigación y hacer posible el hallazgo de esas formas hemolíticas eritroblásticas de la infancia, que no siempre dan la sintomatología clínica completa en la primera infancia, sobre todo las alteraciones óseas que a veces tardan años en aparecer.

No debemos olvidar que se están describiendo casos de esta naturaleza en individuos pertenecientes a la raza blanca no mediterránea, hecho que podría atribuirse a mezclas raciales.

Otro tanto podría decir de la anemia falciforme de la raza negra. También ya se han descrito casos en la raza blanca, especialmente de origen italiano, griego, y según Cooley, aun en la española. Aquí es preciso que el hematólogo, frente a toda anemia crónica de carácter hemolítico, no deje de practicar el examen hematológico en cámara húmeda o hacer la prueba de extraer sangre del dedo previamente ligado, para

producir la anoxemia causante de la deformación semi lunar de los glóbulos rojos y practicar el examen a cámara húmeda.

Con estas consideraciones doy por terminada mi relación sobre enfermedad hemolítica en el niño, y quiero, como conclusión, decir que este capítulo podrá ser más esclarecido entre nosotros, en lo que se refiere a la patología infantil, mediante la estricta colaboración entre el clínico y el hematólogo con criterio y experiencia pediátrica, como lo hemos podido demostrar en algunas de nuestras observaciones.

Bibliografía.

- COOLEY, B. — En Brennemann. Practice of Pediatrics. Vol. III. 16:18.
ARIZTIA, A. — Eritroblastosis fetal. Revista Chilena de Pediatría, pag. 734. 1943.
ARIZTIA, A. — Ictericia grave familiar. Archivos Chilenos de Pediatría. 1927.
ARIZTIA, A.; SCHWARZENBERG y otros. — Anemias en el lactante. Revista Chilena de Pediatría, pag. 1071. 1942.
VACCARO, H. y MEZA, A. — Hemaglutinógeno Rh y eritroblastosis fetal. Revista Chilena de Pediatría, pag. 717. 1943.
WIENER ALEXANDER, S. — Pathogenesis of hemolytic diseases (erythroblastosis fetalis). Am. J. of Dis. of Ch. Vol. 71:14. 1946.
BAAR u STRANSKY. — Klinische Hematologie des Kindesalters. 1928.
SEIFFERT u MORAWITZ. — En Neue Deutsche Klinik. Vol. I, pag. 375.
NAEGELI. — Klinische hematologie und Blundiagnostik. 1931.
FANCONI. — Die primären Anemien und Erythroblastose im Kindesalters. Monatschrift für Kinderheilkunde. Vol. 69. 1937.
JOSEPH, W. — En Holt y Mc. Intosh. Diseases of Infancy and Childhood.