Hospital Luis Calvo Mackenna.
Cátedra de Pediatría.
Prof. A. Ariztía.

PSORIASIS

Consideraciones sobre dos casos.

Por el Dr. NORMAN MOLL LEE

Durante nuestros años de trabajo en la Policlínica del Hospital Luis Calvo Mackenna, nos tocó apreciar solamente en una oportunidad un caso de psoriasis. Revisando la estadística hospitalaria sólo hemos encontrado otro caso más. Esto está de acuerdo con lo declarado por los autores sobre la escasa frecuencia de la psoriasis en la infancia.

El primer enfermo ha sido seguido durante los 2 últimos años y la circunstancia de que haya sido controlado desde los primeros días de vida en nuestra Policlínica, permite tener una historia muy completa, de cuyo estudio se deduce la rebeldía de la enfermedad y su reaparición por brotes anuales, que generalmente se presentan en el enfermo en la misma época anual.

La psoriasis forma, junto con las eczemátides (ref. 1), la pitiriasis rosada de Gibert, la parapsoriasis, la sifilides psoriasiformes y la epidermomicosis eritemaescamosa, el vasto grupo de las dermatosis eritematoescamosas. No es una afección frecuente en la infancia y evidencia una gran multiplicidad y extensión de elementos cutáneos al lado de un carácter rebelde y recidivante. El elemento de la psoriasis en la forma más común, es una mancha roja, circunscrita, cubierta de escamas secas, nacaradas, laminares, friables, abundantes, no infiltradas en la base, y no pruriginosas. La rascadura de estos elementos da origen a 2 signos característicos: 1) El signo de la mancha de bujía, así llamado porque rascando con la uña, la escama se deshace en un polvo fino, micáceo, blanco. 2) El

signo del rocío sangriento, que consiste en que la uña, después de haber arrancado la escama, pone al descubierto una superficie roja y luciente, en la que aparece un fino punteado hemorrágico. Este signo se llama signo de Auspitz.

Se puede comprobar con frecuencia, si se mira con atención, que las manchas psoriásicas están rodeadas de un halo pálido, de 4 a 8 milímetros de anchura, en el que la piel está sana, pero algo descolorida.

Las manchas de psoriasis ordinariamente son redondeadas u ovales. Pueden tener todas las dimensiones, desde la punta o cabeza de alfiler, de una gota de cera, de una moneda, hasta la de extensas placas que cubren toda una región del cuerpo. Generalmente los elementos de una misma erupción tienen dimensiones uniformes; de aquí vienen los términos de psoriasis punctata, numularis, en discos, en sábana, etc., que no tienen más que un valor descriptivo.

La erupción no va acompañada de fenómenos generales; la psoriasis sólo es pruriginosa en los alcohólicos y en ciertos nerviosos. Tiene gran tendencia por las partes del tegumento expuestas a presiones y a traumatismos. El cuero cabelludo se compromete casi siempre. Aquí las manchas o placas psoriásicas se caracterizan por su limitación exacta y la abundancia de escamas blancas o grises, en caparazón o micáceas, que cubren una superficie roja no secretante. Los cabellos se conservan y no ceden a la tracción, cosa que sí sucede en las eczemátides del cuero cabelludo y en las tiñas.

Variedades de psoriasis.

Se ven anomalías en la forma eruptiva, en la distribución y variedades regionales. A veces las manchas de la psoriasis están mal limitadas⁴ superficiales, rosadas apenas y cubiertas de escamas pitiriásicas poco abundantes, ligeramente amarillas. Esta psoriasis atenuada, que se ve con frecuencia en la cara y algunas veces en los órganos genitales, resulta muy difícil de distinguir de las eczemátides. Otras formas son la psoriadís infiltrada, la psoriasis inveterada, etc.

En algunos casos, especialmente en los pliegues articulares, la psoriasis puede tomar el aspecto de placas muy rojas, desprovistas de escamas, o cubiertas de costras, o muy secretantes, como en el eczema rubrum; los bordes son algo irregulares. Sería el eczema psoriasis.

La forma más grave es la llamada psoriasis artropática. La frecuencia de las manifestaciones articulares en la psoria-

sis se calcula en un 5 % de los casos. Con frecuencia, no se trata más que de artralgias, mialgias que se parecen al reumatismo vago subagudo: es la psoriasis dolorosa.

A veces sobrevienen desde la primera erupción artropatías progresivas, nudosas, óseas o fibrosas, que atacan las articulaciones de muchos dedos, una o muchas de las grandes articulaciones, a veces todo un miembro y la columna vertebral y que acaban en deformaciones con anquilosis y retracciones, constituyendo un achaque doloroso de los más lastimosos. Se han observado excepcionalmente osificaciones de los tendones. La psoriasis artropática, muy frecuente para que se pueda explicar como simple coincidencia, constituye para ciertos autores un argumento a favor de la teoría nerviosa; para otros Audry, Pétges, Gaucher (2), a favor de la naturaleza tuberculosa de la psoriasis o de ciertas psoriasis.

Evolución. — La psoriasis es una enfermedad esencialmente crónica, que evoluciona por brotes más o menos bruscos, según los individuos y de una duración muy variable. La primera con frecuencia es más aguda y está compuesta de elementos numerosos y pequeños, sin que esto constituya de ningún modo una regla absoluta. Los brotes ulteriores sobrevienen sin regularidad alguna y sin causa ocasional apreciable.

Diagnóstico. — Es preciso de todo punto insistir en los atributos de la mancha psoriásica. Puede confundirse con el liquen plano, liquen córneo, manchas permicóticas, lúpus eritematoso, pitiriasis rubra pilar, y otras dermatosis eritemato-escamosas.

Anatomía patológica. — La lesión principal de la psoriasis es la paraqueratosis, alteración de la queratinización caracterizada por la desaparición del estrato granuloso y por la persistencia en la capa córnea del núcleo aplastado en las células; esta capa córnea o escama es también menos grasa que en estado normal; las estratificaciones se van acumulando, pero se hienden en láminas con facilidad. El cuerpo mucoso está hipertrofiado y muy engrosado (acantosis) entre las papilas cilíndricas sumamente alargadas (papilomatosis). En las capas superficiales del dermis se encuentran los vasos dilatados y rodeados de células linfáticas.

Tratamiento. — Para Brocq y Jacquet (2) se divide el tratamiento de esta enfermedad en: a) Interno, y b) Externo.

Respecto al primero se recomienda proceder con arreglo a la constitución y antecedentes de los enfermos.

Los tratamientos generales son de resultados bien pobres. El más antiguo y que aun hoy día sigue siendo el tratamiento

de fondo, es el arsénico, que se administra en forma de Licor de Fowler. Se comienza por una o dos gotas y se sigue aumentando hasta dar 10 a 15 gotas diarias y bajar luego lentamente.

Greve, Boeck, Haslund (2) han preconizado el tratamiento por el yoduro de potasio a altas dosis. En el adulto, 5 a 20 gramos diarios.

Se han empleado otras sustancias en la psoriasis, pero sin ventajas serias: el ácido fénico, la trementina, el cacodilato de sodio.

Byrom Bramwell ha tratado a los psoriásicos con extracto tiroideo, sin resultado aparente.

Tratamiento externo: El tratamiento externo de la psoriasis, no la cura en el sentido estricto de la palabra, pero es el único que actualmente da resultados ciertos, puesto que hace desaparecer los brotes. En las formas ordinarias se comenzará siempre por dar varias veces a la semana baños tibios, con fricciones jabonosas (jabón de azufre o de alquitrán de los del comercio), a fin de limpiar la piel y prepararla para la aplicación tópica.

Los tópicos locales (3) más usados son:

1. Aceite de Cade.
2. Crisarrobina.
3. Ácido pirogálico.
4. Naftol.
5. Ácido salicílico.

Solamente hemos usado el aceite de Cade. Propiciamos las fórmulas siguientes (que son las que corrientemente aparecen en los libros dermatológicos):

Rp.

Aceite de Cade	10
Jabón verde	2
Glicerolado de almidón	100
Esencia de Bergamota	XXX gotas

Rp.

Ácido salicílico	2
Aceite de Cade	10
Jabón verde	20
Vaselina	30
Lanolina	40

Para los que se interesen por usar la crisarrobina, damos las siguientes fórmulas, muy utilizadas por los dermatólogos (3).

Rp.

Crisarrobina	5
Pasta de Lassar	100

Mézclease.

* Puede usarse otra fórmula, asociando con el óxido amarillo de mercurio:

Rp.

Crisarrobina	5
Oxido amarillo de mercurio	5
Oxido de zinc	20
Almidón	25
Vaselina	50

Mézclease.

En el caso estudiado por nosotros y tratado en la Policlínica, además del tratamiento local consistente en baños jabonosos y aplicación local de pomada de aceite de Cade al 10 %, hemos dado una alimentación carente en grasas y, al mismo tiempo, durante 2 semanas, altas dosis de Vitamina D, 200,000 unidades diarias, de acuerdo a lo estipulado en 1941 por Krafka (Augusta, U. S. A.), quien trató 25 enfermos de psoriasis con dosis masivas de vitamina D (7).

Observación N° 1. — Guillermo C. — Observación de Hospital N° 40/101. Nació el 1° de agosto de 1940 y fué inscrito en la Policlínica de nuestro hospital el 12 de agosto de ese año. Nacido en parto normal de término.

Antecedentes hereditarios. — De la línea paterna: padre sano de 46 años, trabajador agrícola. Abuelo paterno muerto, se ignoran sus datos. Abuela paterna aun vive, de 70 años, cardíaca. Madre de 27 años, sana. La abuela materna es sana. La bisabuela materna falleció de una probable hepatopatía. El bisabuelo materno murió por apoplejía. El abuelo materno muerto de tífus exantemático. Los 2 bisabuelos por lado de éste, muertos a edad avanzada.

El niño no tiene hermanos.

A los 26 días de edad consulta por haber aparecido una intensa dermatitis seborreica. Esta afección persiste durante el resto de dicho mes y todo se-

tiembre de 1940. Durante el resto del año, solamente consulta para controlar el peso. En el segundo semestre de la vida presenta raquitismo, enterocolitis frecuentes y cuadros gripales. A comienzos de marzo de 1942 presentó una hepatitis de curso fugaz. El 17 de junio consulta por un exantema morbiliforme, sin características ni de sarampión ni de rubeola. Solamente cumplidos recién los dos años, en setiembre de 1942, nuevamente vuelve a consultar por lesiones cutáneas, que en un comienzo presentan las características del eczema. En

Fig. 1.—Manifestaciones psoriásicas al iniciar el tratamiento.

esa época se revela un Pirquet positivo. La radioscopia es negativa. Durante el mes siguiente (octubre de 1942) aumentan las lesiones cutáneas, las que a partir del 13 de octubre evidencian claramente un aspecto psoriásico. Persisten en esta categoría hasta fin de diciembre. Durante los primeros 6 meses de 1943 consulta solamente por trastornos digestivo-nutritivos y cuadros de la esfera rinofaríngea. El 10 de julio consulta nuevamente por su psoriasis, la que dura hasta fines de octubre. Durante la evolución de este brote presenta coqueluche, con caracteres benignos. Durante 1944, hasta mediados de

mayo, no hay lesiones cutáneas, las que aparecen alrededor del 21 de mayo de 1944, durando hasta fines de julio, es decir, 2 y medio meses. En el resto de ese año consulta por rinofaringitis y ascariasis. Nuevamente, en mayo de 1945, reaparece la psoriasis, persistiendo durante 3 y medio meses. En todos estos brotes se ha usado la terapéutica usual, pero como el niño no acudía

Fig. 2.—Veinte días después de iniciada la administración de Vit. D.

con la suficiente frecuencia, el tratamiento no fué efectivo. Pese a la terapéutica, el cuadro dermatológico ha evolucionado siempre con el mismo ritmo y durando cada período más o menos un mismo tiempo.

Consulta a la Policlínica el 20 de julio del 46, porque desde 3 días atrás ha aparecido un nuevo brote de psoriasis. El examen de ingreso señala un niño tranquilo, de buen peso y estatura. Piel morena, en la cual se distingue

en toda la cara anterior del tronco numerosas lesiones eritematoescamosas, de aspecto micropapular las más pequeñas y numulares las mayores. Por la cara posterior del tronco se distinguen las mismas lesiones, pero más grandes; algunas tienen el tamaño de gruesas placas, mayores que una moneda corriente. Las extremidades participan también, pero en menor grado. A nivel del cuero cabelludo, las lesiones se confunden en una masa de carácter seborreico. El resto del examen es negativo.

Los exámenes de laboratorio dan los siguientes datos: V. H. S.: 50 mm. por hora. Reacción de Kahn: (—). Hemograma: solamente digno de mencionar una eosinofilia de 6 %. Radioscopia de tórax: (—).

Se instituye un tratamiento local a base de pomada de aceite de cade al 10 %. Durante los primeros 15 días se administran dosis intensas de vitamina D en forma de comprimidos de Osterón: 4 comprimidos diarios (200.000 U.), acompañándose, además, de administración de otro preparado multivitamínico (Vi-penta). La dosis total de vitamina D administrada en 15 días fué de: 3.321.600 Unidades. Al terminar con esta dosis, las lesiones han empezado a limpiarse en el centro. Se continúa después con administración permanente de Vitamina D por vía oral siempre, hasta completar 420.000 U. más de Vitamina D, administradas en los 30 días siguientes. Al cabo de ese tiempo prácticamente no hay psoriasis.

Posteriormente se ha practicado control mensual del niño, cuya piel es siempre limpia, sin lesiones. El último control se verificó hace pocos días, 29 de marzo debido a un estado gripal.

Observación N° 2. — Rosa J., de 13 años. — Observación 44/415, que ingresa el 11-11-44 al Servicio de Recepción.

Antecedentes sin importancia, salvo en lo que se refiere a la piel, pues en enero-marzo del año anterior presentó lesiones cutáneas caracterizadas por su forma redondeada, rojizas, descamativas, no pruriginosas, que se desvanecieron espontáneamente al cabo de 2 meses.

Su enfermedad actual comienza hace 15 días con temperatura de mediana intensidad, deposiciones líquidas frecuentes. Posteriormente presenta intenso estado tífico y deposiciones con sangre abundante. Ingres a en mal estado al hospital, donde se hace el diagnóstico de fiebre tifoidea en su tercera semana. A los 10 días de hospitalización, cuando las condiciones físicas han mejorado notablemente, aparece una erupción de micropápulas eritematosas, algo pruriginosas en la cara anterior del tórax y en los brazos. Estas lesiones aumentan progresivamente hasta generalizarse, para ir desapareciendo paulatinamente al cabo de 15 días. Tienen en su período culminante las características de las placas de psoriasis.

Como tratamiento se deja exclusivamente la aplicación local de vaselina. Durante los años siguientes no ha vuelto a presentar dichas lesiones. El último control se verificó el 12-IV-47.

Resumen.

Después de revisar las principales características morfológicas de la psoriasis y su terapéutica, señalando la utilización de dosis elevadas de Vitamina D, de acuerdo con lo demostrado por Krafka (7), se presentan 2 casos. Uno visto por nosotros en la Policlínica y el otro correspondiente al único caso anotado en la estadística hospitalaria. El niño G. C. presenta psoriasis desde su segundo año de vida, que aparece por brotes anuales de 3 a 4 meses de duración, para volver a repetirse al año siguiente. Se hace un tratamiento con dosis elevadas de Vitamina D, hasta completar en los primeros 15 días 3.321,600 Unidades. Posteriormente se continúa administrando dosis más pequeñas de Vitamina D, hasta enterar 3.720,000 Unidades. Al cabo de 15 días de iniciado el tratamiento local con aceite de cade y general con Vitamina D, se pudo apreciar una franca mejoría de las lesiones. El segundo caso sólo tiene una importancia ilustrativa y en su tratamiento sólo se usó la aplicación local de vaselina. Debe señalarse que a continuación de la tifoidea por la cual se hospitalizó, no ha vuelto a presentar psoriasis.

Summary.

The author gives the principals characteristics of the skin disease known by psoriasis, very seldom seen during childhood. From the therapeutical standpoint it is given enough importance to the use of, big amounts of vitamin D. The first patient, G. C., shows the disease since his second year of life; beginning in winter months it fades during the spring. It is of the nummular kind, specially in the back. About 3 millions and a half of units of Vitamin D are given during the first fortnight of treatment. At the same time a peculiar ointment of Cade's Oil at 10 % has been used daily.

The second patient, a girl came with a very mild sort of psoriasis that appeared a year before. 1944 she had a typhoid fever and at the same time a second invasion of the skin disease. The following years the psoriasis was not seen again.

Bibliografía.

- 1.—J. DARIER. — Dermatología. Salvat, 1941.
- 2.—C. BROcq. — Dermatología. J. Morata. 1925.
- 3.—A SAINZ DE AJA. — De terapéutica dermatológica. Publicaciones E. M. S. Barcelona. 1941.
- 4.—DERMATOLOGIE. Die Deutsche Klinik. Urban. 1905.
- 5.—BRENNEMANS PRACTICE OF PEDIATRICS. — W. F. Prior. 1945.
- 6.—HOLT'S DISEASES OF INFANCY AND CHILDHOOD. — Appleton. 1936.
- 7.—YEAR BOOK OF DERMATOLOGY. — 1942. The Year Book Publishers. Chicago. 1943.