ELECTROPROTIDOGRAMA EN LA DISTROFIA CON EDEMAS

(Estudio de 43 casos)

Drs. FLORENCIO A. BOLLO¹ y RAMON MONTERO SCH.²

Con el objeto de precisar las alteraciones de los protidos séricos en el curso de los trastornos nutritivos crónicos del lactante, en especial en aquellos que se acompañan de edemas y cuya denominación es variable: Distrofia Farinácea, Kwashiorkor, síndrome pluricarenal, pelagra infantil, etc. 2-8-12-14-19-39, hemos recurrido a su estudio mediante la electroforesis en papel. Este método, como es sabido, consiste en la migración catódica y anódica que experimentan las partículas albuminoides, ya sean del plasma o suero sanguíneos, exudados, L. C. R., orina, leche, etc., al ser colocadas dentro de un campo eléctrico de potencial constante 16-17-22-23-36-40-43-46.

METODO Y MATERIAL DE ESTUDIO

Para nuestro estudio nos hemos servido del aparato conocido por Elphor H, o método de Grassmann-Knedel-Hannig 16-25-43, sistema que no nos informa como otros más perfeccionados, sobre el fibrinógeno del plasma ni sobre las fracciones globulínicas gamma 2 y gamma 3; pero que, sin embargo, dada su sencillez y reducido costo resulta de valor en la práctica clínica.

Desde ya, podemos informar que en ninguna de nuestras determinaciones encontramos fracciones Beta 2, o de para-proteínas.

El tiempo que hemos empleado en la electroforesis fué de 14 horas en un ambiente fresco (de 18 a 20° c.). Como colorante usamos con éxito el azul de Bromofenol en lugar del Negro Amidado, en atención a su menor costo e iguales resultados. Para la lectura de las bandas se empleó el densitómetro Elphor H, previa colocación de estas en solución de Transparenzol. Por no disponer aún del Fotómetro automático Elphor-Integrator, con el que esperamos contar en breve, las

áreas correspondientes a cada fracción fueron medidas por planimetría. En la representación gráfica de los resultados, hemos seguido el método de la Clínica Infantil de Munich expuesto por los Drs. Freisleder y Pache 11.

Como escala de valores normales usamos la dada a conocer por el Prof. H. J. Antweiler de Bonn Alemania 24, por considerar que aún no poseemos en la literatura nacional o Sudamericana, la suficiente casuística para las edades normales infantiles. No por ello dejamos de reconocer el esfuerzo que han significado los trabajos realizados en 1951 con el método de Tiselius, por los Drs. Werner Bustamante, Manuel Madrid y Sergio González 15 y los efectuados recientemente por el Dr. Fernando Mönckeberg y colaboradores 44, con el mismo sistema empleado por nosotros.

El cuadro Nº 1 muestra el tipo de protidograma, igual a cualesquiera de los 140 que se efectuaron para el presente trabajo.

El cuadro Nº 2 muestra las edades y el sexo de 43 niños afectados de Distrofia con Edemas, hospitalizados en los diferentes Servicios de Medicina del Hospital "Luis Calvo Mackenna" en el periodo 1955-56.

En todos los niños el primer protidograma se hizo al momento del ingreso y los siguientes con 10 días de intervalo, hasta completar en la mayoría de ellos, 3 a 4 determinaciones. En algunos pacientes, cuya hospitalización se prolongó, fué posible completar hasta 6 protidogramas. (En total, como ya dijimos se efectuaron 140 determinaciones electroforéticas).

El cuadro Nº 3 muestra el porcentaje medio de los protidogramas de ingreso de las 43 observaciones.

El cuadro Nº 4 muestra 36 protidogramas de 12 observaciones (con 10 días de intervalo cada una) de niños afectados de Distrofia con edemas, de edad y condiciones estadísticamente semejantes (Observaciones correlacionadas).

¹ Becario argentino.

² Cátedra de Pediatría Prof. Anibal Ariztia A. Hospital "Luis Calvo Mackenna". Servicio Nacional de Salud.

En este cuadro puede verse, comparando los protidogramas I-II y III, cómo se normaliza la cantidad y calidad de los prótidos del plasma sanguíneo por la acción de la dietética y medidas higiénicas en el niño hospitalizado. Estos niños no recibieron plasmoterapia ni transfusiones sanguíneas. A los 30 días de tratamiento el protidograma está en los límites de la normalidad.

Resumen y Comentario: Se estudian las alteraciones de los prótidos séricos por medio del electroprotidograma en 43 ni-

ños afectados de Distrofia con Edemas, hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital de Niños "Luis Calvo Mackenna" durante los años 1955-56 y cuyas edades fluctuaban entre 7 y 30 meses.

El electroprotidograma de ingreso de las 43 observaciones reveló una disprotei-

CUADRO N° 3

ELECTROPROTIDOGRAMA DE INGRESO EN 43 NIÑOS AFECTADOS DE DISTROFIA CON EDEMAS

PORCENTAJE MEDIO		VALORES NORMALES
SERINAS	43.13%	63.5% $\pm$ 2.8
Globulinas	α_1	5.64% 4.8% $\pm$ 0.7
	α_2	14.87% 7.5% $\pm$ 1.9
	β	10.53% 12.7% $\pm$ 1.9
	γ	22.75% 11.5% $\pm$ 2.9
FROMEDIO PROTIDEMIA		48.4 grs. % 71 $\pm$ 7 grs.
Total/grs. %		

CUADRO N° 2

43 OBS. DE DISTROFIA CON EDEMAS SEGUN SEXO Y EDADES

SEXO	EDAD (meses)				TOTAL
	6 a 12	13-18	19-24	25-30	
MASCULINO	4	8	4	1	17
FEMENINO	7	7	7	5	26
TOTAL	11	15	11	6	43

CUADRO Nº 4

ELECTROPROTIDOGRAMAS EN 12 OBSERVACIONES CORRELACIONADAS DE NIÑOS AFECTADOS DE DISTROFIA CON EDEMAS

		I	II	III	VALORES NORMALES
		PORCENTAJE	MEDIO		
SERINAS		43,13%	50,82%	52,66%	63,5% $\pm$ 2,8
Globulinas	α_1	6,43%	4,53%	2,72%	4,8% $\pm$ 0,7
	α_2	14,82%	14,79%	12,55%	7,5% $\pm$ 1,3
	β	12%	11,02%	12,01%	12,7% $\pm$ 1,9
	γ	23,6%	18,56%	14,97%	11,5% $\pm$ 2,9
PROMEDIO					
PROTIDEMIA		47,61	59,67	62,46	71 $\pm$ 7 grs.
Total/grs. %					

nemia, con marcada hipoproteinemia e hiposerinemia, aumento relativo y absoluto de las globulinas Alfa 2 y Gamma y niveles prácticamente normales de Alfa 1 y Beta globulinas.

De los 43 casos se excluyeron los que presentaron enfermedades infecto contagiosas o que recibieron plasmoterapia o transfusiones sanguíneas, ellos serán motivo de otras comunicaciones. Se formó con los restantes un grupo homogéneo de 12 casos correlacionados con 3 determinaciones cada uno: al ingreso, a los 10 y a los 20 días de hospitalización.

En este grupo todos presentaron, en el primer protidograma, las características ya mencionadas. (Véanse cuadros Nº 3 y 4).

En la segunda determinación, efectuada 10 días después (niños con régimen alimenticio sin carencia alguna, y que correspondió a la fase clínica de desaparición del edema, se observó una evidente mejoría de la disproteinemia: 1º) proteinemia total prácticamente dentro de los límites normales, 2º) serinemia en vías de corrección, 3º) gamma globulina prácticamente sin modificaciones en relación al 1.º Protidograma.

En el tercer protidograma, a los 20 días de hospitalización observamos la disproteinemia en franca recuperación: I) proteinemia total normal, II) hiposerinemia moderada, III) gamma globulina normal y Alfa 2 globulina medianamente elevada".

* Aunque por todas las determinaciones de esta última globulina, hechas en el país, esta cifra sería de absoluta normalidad.

Con los resultados obtenidos en este estudio, consideramos que el electroprotidograma es de mucha importancia para valorar, conjuntamente con los demás signos clínicos, la intensidad, evolución y pronóstico del cuadro patológico conocido con la denominación de Distrofia con Edemas, pues nos informa de las modificaciones que las albúminas del órgano líquido de la economía (el plasma sanguíneo) experimentan en este cuadro de tan grave desnutrición.

SUMMARY

In Hospital Calvo Mackenna, in 1955 and 1956, it was studied the serum protein in 43 infants (from 7-30 months old) that suffered distrofia with edema by electroprotidograma.

The electroprotidograma taken at the ingress of these infants, showed a disproteinemia and hiposerinemia; an increase of alfa 2 and gamma globulins and normal levels of alfa 1 and beta globulins.

The evolution of these examinations showed in twelve similar cases, an improvement, at first of the total proteinemia, second of serinas, then gamma globulin and at last, the rest of globulin fractions.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.—HUNGERLAND, HEINZ. — Acerca del edema del niño prematuro. Revista Española de Pediatría. 10:819. 1954.
- 2.—GÓMEZ, F. y cols. — Estudios en niños desnutridos. American Journal of Diseases of Children. 87: 673. 1954.
- 3.—FRIED, CH. y cols. — Hipogamaglobulinemia con edema e hipoproteinemia. Pediatrics. 4:53. 1954.
- 4.—Prof. E. ROMINGER. — Vitamin T Goetsch. Archiv. für Kinderheilkunde. 49:1 1954.

- 5.—LAPIN, J. H. — Errores comunes en la alimentación infantil. *The Journal of Pediatrics*. 45:583, 1954.
- 6.—STURE RAFSTEDT. — Studies on Serum Lipids and Lipoproteins in Infancy and Childhood. *Acta Paediatrica*. 44:588, 1955.
- 7.—STURE RAFSTEDT. — Studies on Serum Lipids and Lipoproteins in Infancy and Childhood. *Acta Paediatrica*. (Scandinavica). 44:102, 1955.
- 8.—H. C. TROWELL; J. N. P. DAVIES; R. F. A. DEAN. — Kwashiorkor and Malnutrition. *Acta Paediatrica* (Scandinavica). 44:487, 1955.
- 9.—GREENSPAN, E. M. and FREILING, D. A. — Serum mucoprotein level in differentiation of hepatogenic from obstructive jaundice. *Arch. Internal Med.* 91: 474, 1953.
- 10.—ROMANI, J. D. — La recherche e l'evaluation des glycoproteins de serum a l'aide de l'electrophorese su papier. *La Presse Medicale*. 62:178, 1954.
- 11.—H. D. PACHE and W. FREISLEDERER. — Beste hen Beziehungen der Purpura Schönleini Henoch und der Periarthritis nodosa zum rheumatischen Formenkreis? *Monatsschrift für Kinderheilkunde* (München). 103:123.
- 12.—ARIZTIA, A. — Síndromes edematosos con hipoproteinemia en el niño menor. *Rev. Chilena de Ped.* 9:1, 1938.
- 13.—ARIZTIA, A. — Trastornos nutritivos crónicos en el lactante. *Rev. Chilena de Ped.* 12:247, 1941.
- 14.—SCROGGIE, A. — Síndromes policarenciales en la infancia. *Rev. Chilena de Ped.* 13:945, 1942.
- 15.—BUSTAMANTE, W.; MADRID, M. y GONZALES, S. — Determinación electroforética de las seroproteínas sanguíneas en el Lactante Eutrófico y Distrófico. III Congreso Sudamericano de Ped. Montevideo. 2: 283 y 286, 1951.
- 16.—MONTERO, R. — La Electroforesis (sus fundamentos). *Rev. Chilena de Ped.* 27:27, 1955.
- 17.—MONTERO, R. — La electroforesis cuantitativa. *Rev. Chilena de Ped.* 27: 82, 1955.
- 18.—D. CONDRA, J. — Distrofia pluricarencial hidropigena. *J. de Pediat.* 19:144, 1954.
- 19.—GARRAHAN, J. — Comentario crítico sobre trastornos nutritivos del lactante y distrofia carencial. *Arch. Arg. de Ped.* 37:121, 1952.
- 20.—GARRAHAN, J. y Cois. — Comentario estadístico sobre distrofia carencial. *Arch. Arg. de Ped.* 37: 197, 1952.
- 21.—MARTIN DU PAN, R. y Cois. — Estudio electroforético de las proteínas séricas en el prematuro durante los 4 primeros años de la vida. *Arch. Franc. de Ped.* 10:1013, 1953.
- 22.—ORLANDINI, O. y Cois. — Las seroproteínas en el lactante en especial relación a la gama globulina. *Rev. Peruana de Ped.* 11:99, 1952.
- 23.—NIEMEYER, H.; LOPEZ, R. y MENEHELLO, J. — La hemodilución como factor coadyuvante en el descenso de las proteínas séricas en el edema de hambre. *Rev. Chilena de Ped.* 21:157, 1949.
- 24.—ROLF CARBALLO. — Disproteinemias. (España), 1953.
- 25.—H. J. ANTWEILER. — Die Quantitative Elektrophorese in der Medizin. (Bonn). Springer Verlag-Berlin Göttingen-Heidelberg, 1952.
- 26.—H. KELLNER und H. SÜDHOF. — Monatsschrift für Kinderheilkunde. Zur chemischen Charakterisierung des Serumweißes. 103 Band. Heft 8-August. Pág. 385.
- 27.—L. KULIN. — *Annales Paediatrici*. Sept. 54. Vol. 183. Pág. 162.
- 28.—J. HOLMOLKA. — *Annales Paediatrici*. Agosto 54. Vol. 183. Pág. 96.
- 28.—G. HOOFT y R. OLARA. — *Annales Paediatrici*. Agosto 54. Vol. 182. Pág. 334.
- 30.—H. SCHONENBERG. *Annales Paediatrici*. Agosto 5. Vol. 182. Pág. 355.
- 31.—L. CORBEE y Cois. — *Archives Francaises de Pediatric*. Dic. 1954. Vol. 11. Pág. 561.
- 32.—G. ANDRA. — Distrofia pluricarencial hidropigena. *Journal de Pediatric*. Abril-Mayo, 54. Vol. 19. Pág. 144.
- 33.—FRAY BENTOS y YOUNG. — Resultados y experiencias con hipotróficos en Cl. Pediátricas. *Archivos de Pediatric del Uruguay*. Vol. 25. Nov. 54. Pág. 727.
- 34.—CAMACHO GAMBA, J. — Problemas de la desnutrición en los países latinoamericanos. El hierro endógeno en la Anemia Carencial del Trópico. *Revista Colombiana de Pediatric y Fiericultura*. 14:81, 1955.
- 35.—CROCCO, G. y COLETTA, A. — Ricerche sul contenuto in glicoproteine del siero nell'infanzia in condizione normali e patologiche. *La Pediatric*. 9: 764, 1953.
- 36.—HOMOLKA, J. — Die Blutweißkörper und ihre Veränderungen in der elektrophoretisch-polarographischen Forschung. *Annales Paediatrici*. 183:96, 1954.
- 37.—SCHONENBERG, H. — Essentielle Hypoproteinämie mit Tetania. *Annales Paediatrici*. 182:355, 1954.
- 38.—HOMOLKA, J. and MYDLIL, V. — Blood proteins in infants from a quantitative and qualitative point of view. *Annales Paediatrici*. 85:129, 1955.
- 39.—TUÑON, R. — Sobre un caso de Kwashiorkor. *Acta Ped. Española*. 152:608, 1955.
- 40.—BLANCO, M. y PINTO, J. — Valor práctico de la electroforesis en Pediatric. *Acta Ped. Española*. 153: 691, 1955.
- 41.—TARACENA, B. — La desnutrición en el niño. *Acta Ped. Española*. 152:836, 1955.
- 42.—ABALLI³ A. y Cois. — Alteraciones hepáticas en los trastornos nutritivos. *Revista Cubana de Pediatric*. 26:431, 1954.
- 43.—WUNDERLY, CH. — Die Papierelktrophorese. Verlag H. R. Saurlander y Co. Aarau y Frankfurt A. M.
- 44.—IVANOVIC, F. MONCKEBERG y M. PERRETTA. — Estudios de las Proteínas séricas por electroforesis en papel. Tesis, 1956.
- 45.—CARMEN VELASCO, GABRIEL LOBO PARGA y Cois. Microelectroforesis en papel de las Proteínas del Suero del R. N. y lactantes normales. *Rev. Chilena de Pediatric*. 27: 1956.
- 46.—AGOSTINI, R. y M. J. RUSSO. — Electroforesis. Fraccionamiento proteico en papel de filtro. *Medicina Panamericana*. 6:6, 1956.