TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO

Dr. CARLOS ROJAS MORALES

Servicio Nacional de Salud. Servicio de Cirugía. Hospital de Traiguén.

Los neoplasmas del testículo significan menos del 1% de todos los tumores malignos y en general se presentan en los individuos entre los 20 a 40 años de edad, es decir, la mayor frecuencia corresponde a individuos en plena vida sexual, siendo excepcional en los niños y en personas de edad avanzada. El 12% de los neoplasmas del testículo se presentan en testículos criptorquídicos.

Con respecto a la criptorquidia se estima que los testículos detenidos en la región inguinal son cuatro veces más comunes que los alojados en el abdomen, sin embargo, uno de cada 20 testículos abdominales padece degeneración maligna, en comparación de uno de cada 80 inguinales.

Esta circunstancia viene en apoyo de la opinión en el sentido que el traumatismo probablemente no es el agente causal importante de la degeneración maligna del testículo inguinal que por su situación está bastante propenso a recibir traumatismos. Por el contrario autores citan como un hecho importante el antecedente traumático unido al aumento de volumen de la glándula que persista por varias semanas para sospechar la lesión tumoral maligna del testículo.

Los tumores del testículo se originan probablemente de algún vestigio de tejido mesonefrico en la región de la red testicular, que es la zona comprendida entre el testículo y el epididimo. En cuanto a su desarrollo, este puede ser lento y solapado o también de evolución rápida.

Para su diagnóstico hay que diferenciarlo de las siguientes afecciones: a) Tuberculosis, b) Hematocele, c) Hidrocele, d) Orquitis Traumática, e) Sífilis, f) Orquiepididimitis inflamatorias.

Pronóstico. Se señala que es más favorable en el teratoma adulto en virtud de su lento crecimiento y del hecho de formar metástasis sólo en períodos avanza-

dos. El pronóstico es desfavorable después de las metástasis. Los teratomas con regiones adenocarcinomasas son de mal pronóstico, se diseminan por metástasis a los ganglios retroperitoneales. Los seminomas son los que acusan un pronóstico mejor de todos los neoplasmas testiculares.

Tratamiento. El tratamiento de estas afecciones es del resorte quirúrgico, seguido con irradiación roentgénica postoperatoria.

Considerando lo excepcional que es el carcinoma del testículo en los menores de edad, me permito dar a conocer un caso clínico en un niño de 1 año 11 meses, hospitalizado e intervenido quirúrgicamente en el Hospital de esta ciudad en el mes de Diciembre del año 1957. Es el primer caso clínico recogido durante diez años de ejercicio profesional en el Servicio de Cirugía del Hospital de Traiguén.

CASO CLÍNICO

A. L. F. Observ. Nº 12864/57. Antecedentes familiares: Padres vivos. Madre sana. El padre indica el antecedente de probable lesión bacilar pulmonar hace 15 años, de la que se recuperó bien.

Antecedentes personales: Nacido el 3 de Enero de 1956 en embarazo de término. Parto normal. Peso al nacer 3.500 gr. Alimentación materna hasta los cinco meses, luego complementada con leche en polvo.

Enfermedad actual: Niño de 1 año 11 meses de edad, traído a la Policlínica de Pediatría el 16 de Diciembre de 1957. Se le diagnostica Orquitis traumática, regresando nuevamente por la misma afección el día 23 del mes indicado, indicándosele concurrir al Servicio de Cirugía de este Hospital; consulta en la Policlínica al día siguiente, relatando la madre lo que a continuación anotamos: encontrándose el niño en buenas condiciones de salud, el

9 de Diciembre —15 días antes— tiene una caída al resbalar desde un piso de madera, recibiendo un traumatismo en los genitales, advertido por quejarse el niño de dolor en esa región.

Al día siguiente aprecia la madre aumento de volumen de los genitales, practicándole desde ese momento tratamiento casero, a base de analgésicos y compresas locales, durante varios días. Como no experimenta mejoría, decide traerlo a la consulta médica, indicado más arriba.

El examen físico practicado el día 24 de Diciembre en nuestro Servicio de Cirugía, comprueba un niño de aspecto nutritivo normal, psiquis lúcido, piel y sistema linfático normal, sistema osteoarticular normal, deambulación normal. Temp. R. 37,8°. Pulso 120. Peso 13.350 gr.

Tórax: Constitución normal. Al examen pulmonar auscultación normal. Corazón: choque de la punta perceptible en el 3er. espacio intercostal. Ruidos taquicárdicos.

Abdomen: Paredes blandas y depresibles. Hígado nada en especial. Bazo nada en especial.

Genitales. Testículo izquierdo: aumento de volumen del tamaño de un huesillo grande, conservando la forma del órgano, de superficie lisa, de consistencia firme, nétreas, con peso aumentado e indoloro a la palpación. Testículo derecho: normal. Escroto: nada en especial.

Hospitalizado se practican los siguientes exámenes: Eritrosedimentación 20 mm. en la hora. Orina normal. Hemograma normal. Radioscopia del tórax normal.

Un control verificado en el Servicio el día 27 de Diciembre, no demostró cambio de la lesión, razón por la que se sospechó la existencia de una lesión tumoral del testículo, decidiéndose la intervención quirúrgica, practicándose la orquidectomía simple el 28 del mes indicado.

La pieza extirpada fué enviada para su examen histopatológico al Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad

de Concepción, habiéndose nos informado el siguiente resultado del análisis:

"El material enviado se compone de un testículo de 3,5 x 2,5 x 1,5 cm., al corte presenta en varias partes del parénquima algunos focos blanquecinos amarillentos.

"Microscópicamente se nota en pleno testículo y en forma infiltrativa un tumor maligno en forma de cordones sólidos o glándulas no muy desarrolladas de epitelios no muy diferenciados con numerosas figuras de mitosis y poco estroma conjuntival.

Diagnóstico: Adenocarcinoma del testículo, originado probablemente en un teratoma". Prof. Herzog.

El post-operatorio inmediato del enfermo fué muy favorable, siendo dado de alta en perfectas condiciones el 4 de Enero de 1958. Posteriormente, en Febrero de este año, fué enviado al Instituto Nacional del Radium.

Hemos controlado a este enfermito periódicamente en el curso de este año, habiéndose realizado el último en el mes de Noviembre, siendo su estado actual estimado como satisfactorio.

RESUMEN

Se presenta un caso clínico de tumor maligno del testículo en un niño de 1 año 11 meses de edad, siendo el primer caso observado y operado en un niño menor dentro del Servicio de Cirugía del Hospital de Traiguén. El estudio histológico revela un adenocarcinoma testicular, originado probablemente en un teratoma.

Se indica la evolución post-operatoria alejada que significa un año de observación.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.—REGATO, J.; ACKERMAN, L. — Cáncer: diagnóstico, tratamiento, pronóstico. 743-759, 1951.
- 2.—SEGOVIA CABALLERO, J. — Tratado de Operatoria General y Especial. Vol. Nº V: 207-212, 1951.
- 3.—RECCIUS, A. — Tratado de diagnóstico quirúrgico. 554-556, 1940.
- 4.—FARGUE, E. — Tratado de Patología Externa. Vol. 11, 1941.