OBSTRUCCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Dra. LEA CARLINI

Servicio de Pediatría Prof. Julio Schwarzenberg y Cátedra de Pediatría Prof. Adalberto Steeger.
Hospital San Juan de Dios.

El Hospital San Juan de Dios contribuye a la mesa redonda sobre cuadros obstructivos de las vías respiratorias, refiriéndose a los procesos de este tipo observados en la reciente epidemia de sarampión (1958), en la que predominó esta forma de complicación.

La casuística puede parecer reducida, comparada con la de otros hospitales, pero ello está en relación a la capacidad de nuestro Servicio de Infecciosos, que no sobrepasa las treinta camas. Además, el sector correspondiente a este Hospital no cuenta en la actualidad con Posta Infantil motivo por el cual los casos producidos en la noche y que acuden a esos Servicios de Urgencia, son hospitalizados, en otros establecimientos.

El material de esta presentación ha sido seleccionado, refiriéndose exclusivamente a niños hospitalizados. Incluye solamente los cuadros de franca obstrucción respiratoria y se han dejado de lado, los que en un primer momento parecían serlo, como laringitis catarral, traqueitis, bronconeumonías.

Entre los meses correspondientes al 1º de Mayo y 1º de Septiembre de 1958, se hospitalizaron en la Sección de Infecciosos del Servicio de Pediatría 224 enfermos; de ellos 130 lo fueron por sarampión complicado. De estos, 68 ingresaron con el diagnóstico de obstrucción respiratoria; pero solo fué comprobada en 43 casos. Los 25 restantes presentaban, o una laringitis catarral, con solo disfonía y tos perruna, o bien se trataba de cuadros de bronconeumonía, con gran disnea. (Cuadro 1).

La distribución de estos enfermos por edades, demostró que ésta complicación, dominaba en los niños, de 1 a 2 años, lo

que concuerda con estadísticas nacionales y extranjeras. (Cuadro 2).

CUADRO Nº 2

DISTRIBUCION

EIad (meses)	Enfermos Nº de casos	Fallecidos Nº de casos
0 — 12	7	3
13 — 24	20	3
25 — 36	7	1
— de 36	9	3
Total	43	10

El estado nutritivo, de los enfermos hasta los dos años de edad, ha sido evaluado, según la clasificación seguida en el Servicio. Esta relaciona; el progreso de peso real, con el progreso ideal respecto al peso de nacimiento.

Así, un lactante, que ha dejado de progresar, en su peso un 33%, es catalogado, como distrofia I. Un déficit del 50% es una distrofia II, y sobre el 66%, es una distrofia III.

La complicación obstructiva fué más frecuente en los distróficos que por lo demás, forman el material corriente de los hospitales. (Cuadro 3).

El momento de aparición de la complicación, respecto a los periodos del sarampión, fué de preferencia la fase eruptiva. (Cuadro 3).

CUADRO Nº 3

ESTADO NUTRITIVO (menores de 2 años)

Dist. I	Dist. II	Dist. III	Eutrof.	Total
10	11	3	3	27

APARICION DE LA COMPLICACION

P. Catarral	P. Eruptivo	P. Declinación
2	25	16

CUADRO Nº 1

1º DE MAYO AL 1º DE SEPTIEMBRE DE 1958

Total de hospitalizados en Infecc.	224
Sarampión complicado	130
Ingres. diag. obst. respiratoria	68
Obst. respiratoria comprobada	43
Bronconeum. y laringitis catarr.	15

No hemos encuadrado nuestros casos de obstrucción respiratoria, dentro de las clasificaciones existentes. Es de todos conocido, el gran número de ellas, las distintas denominaciones, para un mismo

cuadro; las diversas causas, invocadas, para su división; etiológica, topográfica, anátomo patológica, etc.

Partiendo de la base, que eran todos. cuadros de etiología conocida, puesto que en todos ellos, estaba presente, el sarampión, consideramos de mayor interés, definir, el grado de obstrucción respiratoria, basado en la observación clínica del enfermo, lo que nos permite orientar nuestra terapéutica y nos puede plantear en un determinado momento la oportunidad de una traqueotomía.

Tal como lo hemos visto descrito hemos reconocido en la evolución, de la obstrucción respiratoria, tres períodos o grados:

Obstrucción de grado I, llamado período de la ronquera o disfonía se caracteriza por: tos perruna, estridor respiratorio, disfonía, disnea inspiratoria, retracción torácica infracostal inspiratoria.

Obstrucción respiratoria de grado II, llamado período disneico. La progresión de los síntomas lleva a una dificultad en la expiración que se hace activa, con participación de los intercostales y de la prensa abdominal. Hay retracción supratórácica, de las fosas supra e infraclavicular, la retracción infratorácica es muy marcada. Existe inquietud y sed de aire. Cualquiera emoción, puede producir cianosis transitoria.

La obstrucción de grado III, o período de la cianosis permanente o asfíctico. En este período, ya no hay retracción torácica, sino más bien una respiración superficial, polipnea, transpiración fría, somnolencia o sopor, la cianosis es permanente. El enfermo que ingresa en este período, puede ser fácilmente confundida con una bronconeumonía. El pronóstico es grave.

La separación de estos períodos, no es tan neta, ni esquemática. Hay factores que influncian en la gravedad del cuadro clínico, o en la rápida sucesión de los períodos, por lo que debe hacerse, una observación minuciosa de los síntomas y mantener una vigilancia constante, sobre estos enfermos.

La obstrucción respiratoria de grado I, generalmente, es bien tolerada, la hemos visto regresar en horas o en pocos días. En otros casos, puede pasar a grado II, en este momento debemos extremar nuestra atención, ya que la mantención de

la sintomatología, o la progresión de ella puede significarnos, un cambio de terapéutica, e ir a la intervención quirúrgica. Consideramos que una observación prudential de unas tres horas, es plazo suficiente para ello. Esperar la aparición de cianosis para decidir la traqueotomía, lo consideramos un error.

Siguiendo el estudio de nuestros casos, tenemos que en un grupo de 16 enfermos, hubo concomitancia con un cuadro pulmonar, comprobado clínica y radiológicamente. De estos enfermos fallecieron 10. (Cuadro 4).

CUADRO Nº 4

Grado obst.	Nº	Bronconeum.	Fallecidos
I	19	4	1
II	26	10	7
II-III	4	2	2
Total	43	16	10

En la mayoría de ellos la complicación era de tipo bronconeumónico; pero hubo un caso que se trataba de atelectasia, por obstrucción bronquial, que desapareció al efectuar la traqueotomía y aspiración de secreciones por la cánula.

En casi todos los enfermos, se hizo estudio bacteriológico de la secreción faríngea, no se observó nada de característico en su resultados. No se comprobaron casos de asociación con bacilos diftéricos.

En cuanto, al tratamiento, hay acuerdo unánime, que estos enfermos se benefician, con el aislamiento, la tranquilidad y ambiente húmedo.

No disponemos en nuestro Servicio de cámaras crupales y hasta hace poco, se les suministraba, calor y humedad, por dispositivos improvisados.

Ultimamente, con el envío de las croupettes, son colocados, en un ambiente de oxígeno húmedo y frío. Esta medida se ha demostrado beneficiosa, en enfermos, con obstrucción de grado I, o de grado II, recién iniciado y sin complicación pulmonar.

Todos estos enfermos fueron tratados con antibióticos. Observamos que la evolución del cuadro obstructivo, o de la complicación pulmonar, no fué muy diferente con los distintos antibióticos usados. Ninguno da amplia seguridad. Por razones de mayor disponibilidad, hemos empleado la acromocina, a razón de 50 a

100 mgrs. por kilo de peso, durante 8 a 10 días. En algunos casos, lo hemos asociado a la penicilina.

En 22 enfermos hemos usado el meticorten, esperando que la acción anti-inflamatoria y anti-edematosa de esta hormona, influyera en el cuadro obstructivo, evitando una traqueotomía. Sin embargo, como puede observarse en el cuadro 5, en 10 enfermos con obstrucción de grado II, tratados previamente con meticorten, hubo que hacer traqueotomía.

CUADRO Nº 5
METICORTEN + CLORPROMAZINA

P. obst.	Casos	Mejor.	Traq.	Fall.	C. Pul.
I	11	10	1	—	1
II	10	3	7	5	4
III	1	—	—	1	1
Total	22	13	8	6	6

La acción depresora de las defensas del organismo, que ha demostrado tener el meticorten o la cortisona, sería un serio inconveniente en una enfermedad tan anergizante, como el sarampión. En las obstrucciones con complicaciones pulmonares, podría favorecer la extensión del proceso bronconeumónico.

Por tales razones, hemos preferido dejar de lado, el meticorten, en las obstrucciones respiratorias, sarampionosas.

Ultimamente, hemos empleados, como sedante y antiespasmódico el "Calcibronat" * por vía endovenosa en dosis de 5 cc y hasta dos veces al día. Se han tratado hasta la actualidad, ocho casos con obstrucciones de I a II grado y sea por coincidencia, o porque ha declinado la violencia de las complicaciones, no hemos tenido que recurrir a la traqueotomía en ninguno de ellos.

Aunque el número de tratados es pequeño, es de interés considerar esta medicación, en los casos de obstrucción aguda de las vías respiratorias.

A fin de calmar la angustia e inquietud de estos enfermos hemos recurrido a la clorpromazina (1 a 2 mgrs. por kilo de peso). Este medicamento se mostró eficaz en obstrucción de grado I recién establecidas. Como puede verse en el mismo cuadro 5, la asociación de clorpromazina y meticorten fué beneficiosa en estos casos.

El uso de clorpromazina en obstrucciones de grado II la consideramos un ar-

ma de doble filo, que enmarcara el cuadro clínico.

En cuanto al tratamiento instrumental de los 43 casos, que forman nuestro material, en 14 se practicó la traqueotomía. Mejoraron 8, de los cuales 3, presentaban bronconeumonía agregada, 4 de estos enfermos habían recibido tratamiento previo con meticorten.

Los otros 6 traqueotomizados fallecieron, en 5 de ellos había complicación pulmonar.

Podemos deducir de ello que la complicación pulmonar, agregada a un cuadro obstructivo, le da un pronóstico desfavorable.

La traqueotomía la consideramos necesaria no solo para eliminar el obstáculo laríngeo, sino como vía de acceso a la tráquea y bronquios, para aspirar las secreciones, muchas veces muy espesas y adherentes, también permite el uso de medicamentos, en gotas o nebulizaciones.

CUADRO Nº 6
TRAQUEOTOMIAS

P. obt.	Nº casos	Mepr.	C. Pulm.	Fall.	C. P.
I-II	1	1	—	—	—
II	11	6	3	5	4
II-III	2	1	—	1	1
Total	14	8	3	6	5

La presencia de una complicación pulmonar, no es contraindicación de la traqueotomía, ante un cuadro de franca obstrucción respiratoria, como lo demuestran los 4 casos traqueotomizados, que mejoraron y que presentaban esta complicación.

El detalle de los traqueotomizados mejorados, nos muestra que: la iniciación de la obstrucción, llevaba entre 4 a 24 horas. Fueron observados un máximo de una a 24 horas. En 4 de ellos, existía, radiología positiva. Cuatro enfermos habían recibido previamente, meticorten. El alta fué concedida entre los 12 y los 20 días de estadía. (Cuadro 7).

En los 6 traqueotomizados fallecidos, la evolución de la obstrucción llevaba de 24 a 48 horas. Fueron observados un período de 24 a 72 horas. En 4 casos, había compromiso pulmonar. En dos casos no se hizo el estudio radiológico por la gravedad del enfermo. En 5 enfermos se usó previamente el meticorten por un período variable

de dos a tres días, a dosis decreciente, iniciándose con 25 a 30 mgrs. diarios. El fallecimiento se produjo entre el 2º y 8º días de la traqueotomía. (Cuadro 7).

CUADRO Nº 7

TRAQUEOTOMIZADOS MEJORADOS (8)

Inic. ob.	Obsv.	R +	R —	Metic.	Ds.	Alta
4 - 24 h.	1 - 24 h.	4	4	4		12 - 20 d.

TRAQUEOTOMIZADOS FALLECIDOS (6)

Inic/O.	Obsv.	R +	R —	Metic.	Ds.	Fall.
24 - 48 h.	12 - 72 h.	4	no	5	2 - 3	2 - 8 ds.

Del análisis de estos casos vemos la importancia que tiene el tiempo de evolución de la obstrucción y su observación. Nuestra experiencia nos ha demostrado, que estos niños con sarampión y cuadro obstructivo, suelen experimentar cambios bruscos y violentos, por lo que consideramos que todos, deben ser hospitalizados y vigilados de cerca.

En las obstrucciones de grado II, la vigilancia debe extremarse y repetimos, que si después de tres a cuatro horas de observación el cuadro permanece igual a pesar del tratamiento médico, debe irse a la intervención.

En resumen podemos decir que:

1) La epidemia de sarampión, del año 1958, se caracterizó por la frecuencia de la complicación obstructiva de las vías respiratorias.

2) Nuestra experiencia se basa en 43 casos comprobados de obstrucción respiratoria, aparecidos en los distintos períodos del sarampión, de preferencia el período eruptivo.

3) La mayor frecuencia la encontramos en niños, de 1 a 2 años y distróficos.

4) De los 43 casos, fallecieron 10, de los cuales 6, se habían traqueotomizados.

5) En 16 casos, junto al cuadro obstructivo, se presentó una complicación pulmonar que decididamente ensombreció el pronóstico.

6) No se observaron cuadros de asociaciones con difteria.

7) El aislamiento, el oxígeno frío y húmedo (croupets), los antibióticos, los sedantes y la observación continuada son las bases del tratamiento de estos enfermos.

8) En cuanto a los antibióticos, no encontramos ninguno específico. Preferimos los de amplio espectro; la evolución del cuadro obstructivo o de la complicación pulmonar, fué muy semejante con cualesquiera de los de este tipo. Por tener mayor disponibilidad, empleamos la acromicina, a dosis de 50 a 100 mgrs. por kilo de peso, durante 8 a 10 días.

9) En un grupo de 22 enfermos, empleamos simultáneamente, a los antibióticos, el meticorten. La acción de esta droga no se mostró efectiva, para evitar una traqueotomía, en 8 casos; además por su acción depresora sobre los mecanismos inmunitarios, la consideramos peligrosa, en una enfermedad tan anergizante, como el sarampión, especialmente si junto a la obstrucción evoluciona una complicación pulmonar, ya que podría favorecer la extensión de él.

10) En la sedación de estos enfermos, se ha proscrito por completo el luminal. La clorpromazina, empleada a dosis de 1 a 3 mgrs. por kilo de peso, ha calmado la angustia e inquietud, de estos pacientes. Fué una ayuda valiosa en obstrucciones en primer período. En obstrucciones de grado II no es recomendable, pues enmascara el cuadro clínico.

En 8 casos hemos empleado, como sedante y antiespasmódicos el Calciobronat, aunque el número de casos es reducido, para adelantar conclusiones pero; sea por coincidencia, o por decrecer la violencia de las complicaciones, los enfermos así tratados han tenido una evolución favorable y no se ha recurrido en ellos a la traqueotomía.

11) En 14 enfermos hubo que recurrir al tratamiento, instrumental, que ha sido exclusivamente la traqueotomía. De estos enfermos fallecieron 6.

El éxito de la traqueotomía depende del tiempo transcurrido en la iniciación de la obstrucción de su asociación o no, con una complicación pulmonar, sin que ello signifique una contraindicación.

Especialmente los enfermos con obstrucciones, en período II, deben vigilarse constantemente, y no esperarse, la aparición de cianosis, para indicar la traqueotomía, sino la mantención, de la sintomatología obstructiva, a pesar del tratamiento médico.