Síndrome Hemolítico Urémico

DR. JOSE LLORENTE HERBACH *.

Siendo el Síndrome Hemolítico Urémico la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en lactantes y preescolares (1 y 2) en nuestros países latinoamericanos, en especial Argentina, no existe aun consenso en su enfoque terapéutico. El motivo de esta publicación es describir el manejo de un paciente de dicho cuadro patológico en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Osorno, el cual fue sometido a Peritoneodialis y tratamiento con Heparina prolongada, procedimientos ambos, no usuales en un hospital de provincia.

CASO CLÍNICO: M. A. N. ficha: 00236568.

Lactante de 7 meses de edad, ingresado por el servicio de urgencia con los diagnósticos de: Diarrea Aguda con deshidratación ¿meningitis bacteriana aguda?, con antecedentes de deposiciones líquidas 4 días antes del ingreso y crisis convulsivas tónico clónicas. El examen físico al ingreso mostraba deshidratación moderada, estertores difusos en ambos campos pulmonares, convulsión tónico clónica y cianosis generalizada. La punción lumbar descarta proceso meníngeo bacteriano y se inicia tratamiento con fenobarbital, furoxona y flebotomía con solución sodio alcalinizante 250 cc por Kg. de peso. Entre el segundo y tercer día de hospitalización, presenta sobrehidratación brusca con ganancia de peso de 1 Kg. (Figura Nº 1) sin mediar aporte excesivo. Esto asociado a los antecedentes anamnésticos, más palidez intensa y oligoanuria, permiten formular los diagnósticos de: Insuficiencia Renal Aguda ¿Síndrome Hemolítico Urémico? ¿Trombosis de las Venas Renales?

Se solicitan con urgencia los siguientes exámenes:

Hemograma: Hto. 28%, Anisocitosis ++, Microcitosis +++ G. Blancos 10.300 mm, Eosi-

nófilos 1, Baciliformes 18, Segmentados 23, Linfocitos 50, monocitos 7. Recuento de plaquetas 39.000 por mm³. Uremia 3,20 gr%.

Radiografía simple de abdomen: no permite visualizar sombras renales.

Se practica denudación venosa iniciando terapia con heparina 1 mg por Kg. de peso cada 6 hrs. mediante infusión de líquidos permanente controlada con microgotero y balance hídrico estricto. Como no se obtuviera diuresis en 24 hrs. y las condiciones generales empeoraran, se decide peritoneodialis. Esta se inicia con baños hipertónicos sin potasio, hasta conseguir un balance negativo de ½ Kg. continuando posteriormente con baños isotónicos por un total de 16 hrs. (con potasio).

Resultado diálisis: peso ingreso 8060 gr., uremia 3,20 gr%; peso egreso 7430 gr., uremia 1,60 gr%.

36 horas después de terminada la diálisis, inicia diuresis espontánea, manteniendo volúmenes bajos (Fig. Nº 1).

96 horas después de iniciado el tratamiento con Heparina, un control de plaquetas demuestra recuperación de plaquetas de 39.000 a 70.000 x mm³. Se continuó con tratamiento anticoagulante durante 8 días, manteniendo vía endovenosa con suero glucosado al 10% 250 cc más 20 mEq de bicarbonato de sodio cada 24 hrs. Los controles de laboratorio al suspender Heparina fueron: plaquetas 94.000 por mm³, uremia 1,80%.

Su evolución clínica fue satisfactoria cediendo el cuadro diarreico en forma progresiva (coprocultivo reveló E. Coli y P. Vulgaris).

Es dado de alta después de 23 días de hospitalización con diuresis satisfactoria y buenas condiciones generales, uremia 0,50 gr. por % y plaquetas 145.000 mm³.

* Servicio de Pediatría. Hospital de Osorno.

Figura Nº 1

Controles posteriores han revelado niño en buenas condiciones generales pero con ascenso ponderal insuficiente.

Últimos controles de laboratorio efectuados 2 y 6 meses después del alta revelan:

Uremia 0,25 0,20

Hemoglobina 13,2 gr. 12,2 gr.

S. Urinario normal normal

(Para mayores detalles de evolución clínica, ver figura Nº 1).

La evolución desde el punto de vista urinario, fue satisfactoria, ya que las alteraciones de la primera orina obtenida (reacción ácida, albúmina no,

glucosa no, microscópico células epiteliales +, leucocitos 15-20 por campo, glóbulos rojos 45-60 por campo) regresaron en forma completa. Además, la ausencia de albúmina en todos los controles, permiten descartar la posibilidad de Trombosis de la Vena Renal.

DISCUSIÓN. Si bien faltan algunos exámenes que no se pudieron efectuar por limitaciones técnicas, (electrolitogramas, frotis sanguíneos para pesquisar glóbulos rojos fragmentados), el diagnóstico de Síndrome Hemolítico Urémico no parece discutible.

En cuanto al tratamiento se siguió una conducta activa basada en las experiencias citadas por autores como Gilchrist, Lieberman y Kitel.

No es posible obtener conclusiones con un solo caso, sin embargo parece interesante comunicar el manejo terapéutico de un paciente con patología de especialidad, en un medio con pocos recursos técnicos y en el que se usaron 2 procedimientos terapéuticos no usuales en medios no especializados como la Peritoneodialis y el tratamiento heparínico prolongado.

REFERENCIAS

- Gianantonio, Carlos. "Síndrome Urémico Hemolítico". *Pediatría*, J. Meneghello, Tomo II, 205, Intermédica. Buenos Aires, 1972.
- Gianantonio, Carlos y cols. "Hemolytic-uremic Syndrome". *The Journal of Pediatrics* 64: 478, 1964.
- Gilchrist G., Lieberman E., Ekert H., Fine R. "Heparin Therapy in the Hemolytic-uremic Syndrome". *Lancet* 1123, junio 1969.
- Duffau G., Llorente J., Enulfork M. "Trombosis de las Venas Renales". *Pediatría* 15, 313, 1972.
- Campbell W., McMillan. "Trastornos adquiridos de la coagulación en los niños". *Clinicas Pediátricas de Norteamérica*, noviembre 1972, pág. 1029.
- Kitel M. "Hemolytic-uremic Syndrome". *Current Pediatric Therapy*, pág. 562. Saunders, 1970.
- Ochoa E. "Síndrome Hemolítico Urémico". *Rev. Chil. Pediatría* 44, 155, 1973.
- Malcolm A. Holliday MD. "Treatment of Renal Failure in Children". *The Pediatric Clinics of Northamerica*. May 1971, pag. 613.
- Salomón A. Kaplan MD. "Peritoneal Dialysis". *Current Pediatric Therapy*, pag. 565, Saunders, 1970.