Síndrome de Alport

Dr. Eugenio Rodríguez S.¹; Dra. Sara Soto M.²;
Dr. Helmar Rosenberg G.³; Dr. Federico Puga C.¹

Alport's Syndrome

Six children with Alport's syndrome are reported, all with the complete form of the syndrome, with deafness and nephritis. Untramicroscopy demonstrated the typical lesions. Clinical signs appeared earlier and were more severe in boys. Deafness was specially referred to high pitch tones. Two patients died of chronic renal failure. Only one patient showed macrothrombocytopenia. No typical ocular lesions were found in our patients. Family history for similar symptoms or signs was inquired in 18 relatives and some evidence could be demonstrated in 11, some of them during infancy.

Este síndrome fue reconocido por primera vez en 1895¹, luego en 1902 fue descrito por Guthrie² como una forma de nefritis familiar, pero sólo en 1927 Alport lo definió al publicar la asociación de nefritis hereditaria y sordera neurosensorial bilateral³. Desde ese momento se han publicado numerosos casos y se han reconocido otras alteraciones que lo acompañan.

Consiste en una nefropatía de carácter familiar, cuya patogenia no se ha definido, que conduce a alteraciones progresivas de la función renal, con manifestaciones diferentes de acuerdo al sexo.

Clínicamente se caracteriza por aparición de un síndrome nefrítico con presión arterial generalmente normal, excepto en la fase terminal de la enfermedad. Se asocia con sordera sensorial, alteraciones oculares especialmente del cristalino⁴⁻⁵ y trombocitopenia con macroplaquetas, signo descrito sólo en 1972⁶. Últimamente también se ha señalado la asociación con ictiosis, hiperprolinemia y polineuropatía⁷.

La enfermedad no tiene tratamiento, pudiendo recurrirse sólo al trasplante renal de cadáver debido al carácter familiar de la nefropatía.

MATERIAL Y METODO

Se analizan las historias clínicas de seis pacientes que fueron controlados en el Servicio de Nefrología del Hospital Luis Calvo Mackenna entre los años 1975 - 1982 y que fueron catalogados como síndrome de Alport por presentar signos de glomerulopatía con hematuria micro o macroscópica, proteinuria, asociado a sordera clínica o demostrada audiométricamente; lesiones histopatológicas compatibles con el

síndrome y antecedentes familiares de nefropatía, sordera o ambas.

En cada caso se analizó el sexo, primeros signos y síntomas de nefropatía, edad de aparición, presión arterial, audiometría, examen ocular, hemograma con especial énfasis en recuento plaquetario, grado de suficiencia renal determinado por la creatinina o nitrógeno ureico. Cada uno de estos parámetros fue seguido en su evolución.

En todos los pacientes se realizó biopsia renal percutánea por lo menos una vez. La muestra obtenida fue examinada mediante microscopio óptico y electrónico y con técnicas de inmunofluorescencia. Este estudio se efectuó en el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile.

Dieciocho familiares de estos seis casos fueron estudiados paralelamente con sedimento de orina, nitrógeno ureico, audiometría, estudio oftalmológico y hemograma con recuento plaquetario.

RESULTADOS

Caso 1: S.G.G. - sexo masculino. Consultó por primera vez a los 8 años por hematuria macroscópica y edema palpebral sin hipertensión arterial. En la orina había 0,42 gr.‰ de albúmina y glóbulos rojos regular cantidad. La función renal era normal. Tres años después, relataba sordera y la audiometría demostró hipoacusia bilateral simétrica. La biopsia renal efectuada a los 13 años de edad reveló al microscopio de luz alteraciones mínimas glomerulares, inmunofluorescencia negativa y a la microscopía electrónica deformación de la membrana basal en toda su extensión con desaparición pedicular. En Mayo de 1982 (14 años) estaba en buenas condiciones generales, su sordera era más intensa y tenía hematuria macroscópica. La presión arterial y función renal resultaron normales. El examen de orina mostró albuminuria de 1,5 gr.‰, glóbulos

¹ Unidad de Nefrología, Hospital Luis Calvo Mackenna.

² Becado de Pediatría, Hospital Luis Calvo Mackenna.

³ Departamento Anatomía Patológica, Universidad Católica de Chile.

rojos abundantes y grasa escasa. El hemograma y recuento plaquetario resultó normal. La audiometría demostró una pérdida de la audición del tipo neurosensorial simétrica. El estudio ocular resultó normal.

Antecedentes familiares: (Fig. 1). Su madre presenta pérdida de la audición del oído derecho. El sedimento urinario y examen ocular son normales.

El padre y una hermana no presentan alteraciones auditivas y el sedimento urinario y hemograma resultaron normales.

Caso 2: J.S.O. - sexo masculino. Consultó por primera vez a los 2 años de edad por hematuria sin proteinuria. A los 4 años de edad se encontraba normotenso y el examen de orina demostró albuminuria de 0.37 gr.‰ con glóbulos rojos abundantes. La función renal era normal. A los 6 años la audiometría demostró una sordera sensorioneural marcada bilateral asimétrica. El hemograma y recuento plaquetario eran normales.

La biopsia renal efectuada a los 4 años mostró, con el microscopio de luz, alteraciones mínimas glomerulares. No se realizó inmunofluorescencia y la microscopía electrónica reveló una membrana basal con deformaciones en rosario, es

decir, zonas engrosadas que alternan con zonas adelgazadas.

Fallece a la edad de 7 años en insuficiencia renal.

Se desconocen antecedentes familiares por tratarse de un hijo adoptivo.

Caso 3: L.M.G. - sexo masculino. Sus síntomas de comienzo aparecieron a los 7 años cuando su madre notó marcada hipoacusia. A los 8 años un examen de orina demostró una albuminuria de 2 gr.‰ y microhematuria. La presión arterial y la función renal en ese momento resultaron normales. Hemograma con recuento plaquetario fue normal. Estudio oftalmológico normal. La audiometría comprobó una hipoacusia sensorio-neural bilateral asimétrica.

La biopsia renal efectuada a los 8 años de edad mostró, con el microscopio óptico, glomerulitis difusa leve con células espumosas intersticiales. La inmunofluorescencia fue negativa. La microscopía electrónica reveló deformación de la membrana basal con aumento del mesangio e interposición hacia las asas capilares libres, desaparición pedicular y depósitos densos escasos en mesangio y membrana basal. El último control efectuado en Abril de 1982 (9 años), mostró función renal y presión arterial normales. En el

Figura 1: Estudio genealógico de 5 familias con Síndrome de Alport.

examen de orina había albuminuria de 1.97 gr.%, glóbulos rojos abundantes, cilindros hemáticos y grasa en regular cantidad.

Antecedentes familiares: (Fig. 1). Un hermano falleció en 1969 a la edad de 10 años en insuficiencia renal asociada a hipoacusia marcada. La madre presentaba microhematuria sin alteraciones auditivas, recuento plaquetario y estudio ocular normales.

Del padre se desconocen datos y aparentemente es sano.

Una hermana de 20 años presentaba hematuria microscópica, audiometría y fondo de ojo normales.

Se estudió además otra hermana que no presenta alteraciones.

Caso 4: R.M.P. — sexo masculino. Primera consulta a los 3 años por hematuria macroscópica con presión arterial normal. A los 12 años un examen de orina demostró hematuria abundante con albuminuria de 0,86 gr.%. La función renal y la presión arterial a esta edad eran normales. El hemograma y el recuento plaquetario resultaron normales. Audiometría: hipoacusia marcada a tonos agudos.

La biopsia renal efectuada a los 13 años mostró al microscopio óptico glomerulitis difusa leve. La inmunofluorescencia fue negativa y la microscopía electrónica demostró engrosamiento difuso de la membrana basal con mesangio levemente aumentado y escasa interposición intercapilar.

El último control se efectuó en 1981 (16 años), presentando el paciente marcado hipoacusia, presión arterial y función renal normales. El estudio oftalmológico fue normal. El examen de orina mostraba glóbulos rojos abundantes, albuminuria de 4 grs.% y células grasas.

Antecedentes familiares: se muestran en la Fig. 1.

Caso 5: L.G.L. — sexo masculino. Su primera consulta la efectuó a los 8 años por hipoacusia, realizándose audiometría que reveló una sordera bilateral simétrica. La presión arterial y la función renal eran normales. El examen de orina demostró una hematuria microscópica.

No se controló hasta los 13 años de edad en que fue hospitalizado con signos francos de insuficiencia renal, hipertensión arterial y anasarca. El examen de orina demostró albuminuria de 3 grs.%, y glóbulos rojos abundantes. La creatinemia era de 7.7 mgrs.%. El hemograma demostró un recuento plaquetario de $70.000 \times \text{mm}^3$ con 30% de macroplaquetas. El examen oftalmológico comprobó coloboma iridiano retinal y de coroides a izquierda.

Falleció a los 13 años en insuficiencia renal.

La necropsia demostró retracción marcada de ambos riñones, pesando uno de ellos 22 grs. y el otro 19. El estudio histopatológico mediante el microscopio óptico mostró distorsión acentuada de la arquitectura renal con fibrosis glomerular difusa.

El estudio de inmunofluorescencia resultó negativo. La microscopía electrónica demostró distorsión de la membrana basal, mesangio muy aumentado con interposición extensa entre las asas capilares, depósitos densos mesangiales e intramembranosos con desaparición pedicular.

Antecedentes familiares: (Fig. 1). Un hermano mayor fallecido un año antes con síndrome de Alport sin alteraciones plaquetarias. Una hermana de 3 meses con microhematuria.

Caso 6: K.S.E. — sexo femenino. Consultó por primera vez a los 6 meses por hematuria. A los 9 años sus familiares notaron marcada sordera. A los 11 años fue reevaluada encontrándose en buenas condiciones generales con presión arterial, función renal y estudio oftalmológico normales. En el examen de orina habían indicios de albúmina y uno que otro glóbulo rojo. El hemograma y el recuento plaquetario resultaron normales. La audiometría demostró una hipoacusia sensorio-neural bilateral.

La biopsia renal efectuada a los 11 años demostró en el microscopio óptico alteraciones mínimas glomerulares. La inmunofluorescencia fue negativa y con el microscopio electrónico se demostraron alteraciones escasas de la membrana basal predominando un adelgazamiento de ella y desaparición pedicular parcial, sin aumento del mesangio.

Antecedentes familiares: El padre y dos hermanos de sexo masculino, presentan hipoacusia sin alteraciones del sedimento urinario, con estudio oftalmológico normal. La madre es hipertensa presentando en el examen de orina una proteinuria leve y la audiometría demostró una hipoacusia sensorio-neural bilateral. Tablas 1 y 2. Fig. 1:

DISCUSION

Mediante el análisis de los casos presentados, podemos apreciar que el síndrome de Alport afecta especialmente al sexo masculino, dando en él todas las manifestaciones. Cinco de nuestros seis casos eran varones y en todos ellos las manifestaciones fueron más severas y se presentaron precozmente. Esto coincide con lo descrito en la literatura donde los hombres que padecen de este síndrome, fallecen por insuficiencia renal en la segunda a tercera década de la vida⁸⁻⁹.

Esto se puede apreciar al analizar también los

antecedentes familiares, en donde todos los portadores de Alport fallecidos eran hombres.

En la mujer podemos observar que las manifestaciones son más tardías, menos severas y casi nunca llegan a insuficiencia renal terminal.

Esta deficiencia en cuanto a sexo aún no ha

sido totalmente explicada. Sería por una herencia de tipo autosómica dominante pero con una penetrancia incompleta para el sexo femenino. Las mujeres actuarían como portadoras, aún cuando no tengan signos ni síntomas de la enfermedad.¹⁰

Tabla 1.

Estudio Clínico y de Laboratorio en seis pacientes con Síndrome de Alport

Sexo	S.C.C. MASCULINO	J.S.O. MASCULINO	M.L.G. MASCULINO	R.M.P. MASCULINO	L.G.L. MASCULINO	K.S.E. FEMENINO
Edad la consulta	8 años	2 años	7 años	3 años	8 años	6 años
Manifestaciones iniciales	Hematuria edema palpebral	Hematuria Macroscópica	Hipoacusia Hematuria	Hematuria Macroscópica	Hipoacusia Hipoacusia	Hematuria hipoacusia
Presión arterial la consulta	normal	normal	normal	normal	normal	normal
Sedimento urinario la consulta	Alb: 0,42 g. % Hematíes abundantes	Alb: 0,37 g. % Hematíes abundantes	Alb: 2 g. % Hemat. abundantes	Alb: 0,86 g. % Hemat. abundantes cilin. granul. cereos	Hematuria microscópica	Alb: indicios hematíes escasos
Creatinina la consulta	normal	normal	normal	normal	normal	normal
Audiometría edad efectuada	Hipoacusia sensoneural bilat. (11a)	Hipoacusia sensoneural bilat. (6a)	Hipoacusia bilateral (8a)	Hipoacusia a tonos agudos (12a)	Hipoacusia bilateral simétrica (8a)	Hipoacusia sensoneural bilat. (10a)
Examen oftalmológico	normal	normal	normal	normal	coloboma iridia-no y ret. a izq.	normal
Recuento plaquetas	normal	normal	normal	normal	70.000 x mm ³ 30% macroplaquetas	normal

Tabla 2

Biopsia Renal en seis casos de Síndrome de Alport

EDAD	S.C.G. 13 a	J.S.O. 4 a	M.L.G. 8 a	R.M.P. 13 a	L.G.L. 13 a (autopsia)	K.S.E. 11 a
MICROSCOPIA DE LUZ	Alt. Glomerulares mínimas	Alt. Glomerulares mínimas	MI: Glomerulitis prolif. difusa células espumosas	Glomerulitis difusa leve	Fibrosis de todos los glomerulos	Alt. mínimas glomerulares
INMUNO FLUORESCENCIA	negativa	no se hizo	negativa	negativa	negativa	negativa
MICROSCOPIA ELECTRONICA	Deformación de memb. basal desaparición pedicelar	Memb. basal engrosada y en partes adelgazada.	Memb. basal deformada aumento mesangio desap. pedicelar	Engrosamiento de memb. basal mesangio levemente aumentado.	Alt. memb. basal mesangio aumentado desap. pedicelar	Adelgazamiento M. basal escaso desaparición ped. escaso.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, éstas se caracterizan principalmente por un síndrome nefrítico con micro o macro hematuria episódica y proteinuria. Todos nuestros casos se presentaron de esta forma. La edad de aparición es variable y muchas veces la proteinuria precede a la hematuria que va acentuándose a medida que el cuadro progresa. La hematuria ha sido descrita ya en las primeras semanas de la vida en hermanos de niños con síndrome de Alport (Caso 5).

Los dos casos fallecidos iniciaron a temprana edad las manifestaciones clínicas de su síndrome nefrítico con hematuria y proteinuria. La aparición temprana de este síndrome tendría peor pronóstico.

La sordera, según la descripción de Alport sería una condición necesaria para describir el síndrome. Todos nuestros niños la presentaron, unos precozmente y otros más tardíamente, siendo difícil definir cuando se instaló realmente ya que es especialmente a tonos agudos y muchas veces sólo pesquizable mediante el examen audiométrico, difícil de efectuar en niños.

Los dos niños fallecidos de esta serie son los que presentaron sordera precozmente, a los 6 años, para el caso 2 y a los 8, para el caso 5. En este último se pesquizó clínicamente.

La sordera se debe a una lesión del órgano de Corti, acentuándose ocasionalmente este síntoma en los períodos hematuricos⁹. Tendría valor pronóstico ya que su presencia indicaría una mayor severidad del cuadro. Dentro de las familias portadoras de Alport, la sordera puede aparecer sin que exista el cuadro nefrológico o vice-versa, incluso puede saltarse una generación. Esto podría ser la explicación de lo que observamos en el caso 6.

Las alteraciones oculares no son frecuentes y sólo tenemos un niño que presentó coloboma iridiano y retinal que no ha sido descrito para este síndrome, ya que las alteraciones propias de él, corresponden al denominado lenticonus, que es una deformación cónica de la cara anterior y posterior del cristalino. La esferofakia es otro signo que se describe en el síndrome de Alport y consiste en una opacidad globular que altera la forma biconvexa del cristalino⁸⁻¹¹⁻¹². También se han descrito cataratas, nistagmus y alteraciones perimaculares; esta última alteración estaría relacionada con una aparición más precoz de insuficiencia renal¹³⁻¹⁴. En nuestros pacientes no encontramos estas alteraciones, las que deben ser buscadas en forma dirigida.

La trombocitopenia con macroplaquetas es otra rara asociación que se encontró en uno de nuestros pacientes (Caso 5). Este enfermo falleció a la edad de 13 años y tiene el antecedente de un hermano fallecido por síndrome de Alport

que no presentaba alteraciones en las plaquetas.

Junto con la disminución en el recuento plaquetario se han descrito defectos de adhesividad de ellas y falla en la liberación del factor 3⁹.

La hipertensión se encontró en la etapa final de nuestros pacientes y también como antecedente de los familiares afectados (Fig. 1).

El estudio histopatológico realizado en todos los pacientes tiene características similares. Al microscopio de luz las alteraciones son mínimas y éstas se van acentuando en etapas terminales del síndrome, pudiendo llegarse a la fibrosis intersticial con presencia de células espumosas y engrosamiento de las paredes arteriolas.

La inmunofluorescencia es negativa en todos los casos presentados. La microscopía electrónica permite llegar precozmente al diagnóstico en forma certera, demostrando las alteraciones características de la membrana basal. Se pueden ver zonas engrosadas que alternan con zonas adelgazadas y en algunos pacientes deshilachamiento de la lámina densa, asociándose esta última lesión a mayor severidad de las manifestaciones clínicas de la nefropatía, detectada especialmente por un incremento en la proteinuria¹⁵⁻⁹.

RESUMEN

Se analizan las historias clínicas de 6 niños portadores de síndrome de Alport. Se incluyeron aquellos pacientes que presentaban signos de nefropatía con carácter familiar asociado a sordera y alteraciones características al microscopio electrónico en la membrana basal glomerular. Se efectuó estudio en 18 familiares de los niños afectados mediante sedimento urinario, estudio oftalmológico, audiometría y hemograma con recuento plaquetario. Se comprueba que las manifestaciones son más frecuentes y más graves en el sexo masculino. La sordera en todos los pacientes fue de tipo neurosensorial y predominantemente a tonos agudos. De los seis casos analizados han fallecido dos por insuficiencia renal. Sólo un caso presentó alteraciones con macrotrombocitopenia. En ningún caso se encontraron las alteraciones oculares descritas como características de este síndrome.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los Médicos Nefrólogos del Hospital Josefina Martínez de Ferrari, quienes nos proporcionaron los datos clínicos y de laboratorio del Caso 5.

REFERENCIAS

- ¹ Pel. P.K.: Die erblichkeit der chronischen nephritis, Ziet. Klin. Med. 38: 127; 1899.

- ² Guthrie L.G.: Idiopathic or congenital hereditary and family hematuria. *Lancet* 1: 1243; 1902.
- ³ Alport A.C.: Hereditary Familial congenital haemorrhagic nephritis. *Brit. Med.* 1: 504; 1927.
- ⁴ Gregg J., Becker S.: Concomitant progressive deafness, chronic nephritis and ocular lens disease. *Arch. ophtalmol.* 69: 293; 1973.
- ⁵ Nielsen C.E.: Lenticonus anterior and Alport's syndrome. *Acta Ophthalmol.* 56: 518; 1978.
- ⁶ Epstein C., Sahud M., Piel C., Goodman J.: Hereditary macrothrombocytopenia nephritis and deafness. *Am. J. Med.* 52: 299; 1972.
- ⁷ Goyer R.A., Reynolds J., Burke J.: Hereditary renal disease and neurosensory hearing loss, Prolinuria and ichthyosis. *Am. J. Med. Sci.* 256: 166; 1968.
- ⁸ Purreil P., Orets M., Pascale E.: Familial Hereditary nephropathy (Alport's Syndrome). *AM.J. Med.* 49: 753; 1970.
- ⁹ Royer P., Habid R.: *Nephrologie Pédiatrique* ed. Flammarion Med. Sciences. 37-41: 1973.
- ¹⁰ Tishler P.: Health and Female carriers of a gene of Alport's Syndrome: importance of genetic counseling. *Clinical Genetics* 16: 291; 1979.
- ¹¹ Mettier S.R.: Ocular Defects associated with familial renal disease and deafness. *Arch. Ophtal.* 56: 386; 1961.
- ¹² Arnott E.J., Crawford M.D.A.: Anterior lenticonus and Alport's Syndrome. *Brit. J. Ophtal.* 50: 390; 1966.
- ¹³ Polak B.C.P.: Macular Lesions in Alport's disease. *AM. J., Ophtalmol.* 84: 532; 1977.
- ¹⁴ Pevin D.: Perimacular changes in Alport's Syndrome. *Clin. Neph.* 12: 163; 1980.
- ¹⁵ Rumpelt H.J.: Hereditary nephropathy (Alport's Syndrome), correlation of clinical data with glomerular basement membrane alterations. *Clin Neph* 13: 203; 1980.
- ¹⁶ Cassidy G.: Hereditary Renal dysfunction and deafness. *Pediatrics* 6: 20: 967; 1965.
- ¹⁷ Hinglais N., Gänfeld J.P., Bols E.: Characteristic ultrastructural lesions of the glomerular basement membrane in progressive hereditary nephritis (Alport's Syndrome). *Lab. Invest.*, 27: 473; 1972.
- ¹⁸ Sherman R.L., Ching J., Yudis M.: Hereditary nephritis with a characteristic renal lesion. *Jama* 56: 44 1974.
- ¹⁹ Spear G.S., Slusser R.: Alport's Syndrome emphasizing electron microscopic studies of the glomerulus. *AM. J. Pathol.* 69: 213; 1972.