CASOS CLINICOS

Rev. Chil. Pediatr. 57(2): 164-170, 1986

Trisomía 22

Dra. Erna Raimann B.¹, T.M. M. Angélica Alliende R.², T.M. M. Virginia Carvajal D.²,
Dra. M. Angélica Belmar S.³, Dr. Edgar Urzúa C.³, Dr. Yves Lacassie S.^{2*}

Trisomy 22

Three clinical-cytogenetical entities involving trisomy 22 have been recently delineated: the Cat-Eye Syndrome, partial trisomy and full trisomy 22, which existence in livebirth is still controversial. We report a newborn with a full trisomy 22 due to a "de novo" (15;22) translocation and two patients with partial trisomy 22 (47,XY and XX, +der(22), t(11;22) (q25;q13)mat), due to a 3:1 segregation of their mothers. The patient with the full trisomy died in the NBP and autopsy showed pulmonary malformations previously not described. The patients with partial trisomy 22 are alive and show mild psychomotor retardation. The clinical and cytogenetical characteristics of the probands and relatives and their recurrence risks are discussed. (Key words: Trisomy 22. Partial. Complete).

En 1886, Haab describió la asociación clínica entre atresia anal y coloboma del iris. En 1965, Schachennmann y cols. demostraron que pacientes con esta asociación tenían un pequeño cromosoma acrocéntrico extra.¹ En los años siguientes se amplió el espectro clínico de esta afección y coloquialmente comenzó a denominarse Síndrome de Ojo de Gato (SOG)^{2, 3, 4}. Con el advenimiento de nuevas técnicas citogenéticas, a principios de la década del 70, Buhler y Hsu demostraron que el fragmento cromosómico extra correspondía a un 22^{3,4}. En 1977, diversos autores señalan la existencia de diferentes formas de trisomía 22, que con frecuencia involucran translocaciones⁵⁻⁷. Sólo en los últimos años se ha logrado diferenciar citogenéticamente 3 afecciones diferentes relacionadas al cromosoma 22 y que comparten ciertas características clínicas: el SOG, que correspondería a una duplicación e inversión del segmento pericentromérico del 22; la trisomía parcial 22 y la trisomía 22 total, cuya existencia aún está en discusión (Tabla 1)^{3,8-10}.

La confirmación citogenética de un paciente con una trisomía 22 total por translocación de novo, en un recién nacido que fallece, y la presencia de trisomía 22 parcial en dos pacientes,

cuyas madres presentan una translocación (11;22), motivan esta publicación.

Casos Clínicos

Caso 1: FN 21/3/1983, recién nacido (RN) de sexo masculino, producto de un sexto embarazo, hijo de padres sanos, no consanguíneos, en que los únicos antecedentes familiares eran la existencia de una hermana de 5 años con retardo mental (RM) de causa no precisada e historia de 2 abortos espontáneos del 1er. trimestre. (Figura 1). El embarazo cursó con polihidramnios y el parto fue de pretérmino (34 semanas), eutócico. El peso de nacimiento (PN) fue de 1.540 gr, pequeño para la edad gestacional (PEG) limitrofe, talla 41 cm, CC 32 cm. La calificación de Apgar fue de 3,5 y 7 al 1', 5' y 7' respectivamente.

En el examen físico la frente era amplia, occipital prominente, blefarofimosis, coloboma bilateral del iris, fosetas preauriculares, deformación de los pabellones auriculares, micrognatismo, dedos índice pulgarizados, epispadias e imperforación anal (Fig. 2, A.B.C.).

Evolucionó con un síndrome de dificultad respiratoria (SDR) grave, falleciendo a las 48 horas de vida. El estudio anatomopatológico, además de las malformaciones señaladas, reveló la existencia de cardiopatía congénita compleja (Defecto septal interventricular e intramuscular,

1. Becada Pediatría, U. Católica.

2. Unidad de Genética, INTA, U. de Chile.

3. Hospital Regional Temuco.

* Trabajo presentado en XV Congreso Nacional de Pediatría, La Serena, 1984.

Genealogía. Caso 1.

Genealogía. Caso 3.

F II-3 MALFORMACION PABELLONES
AURICULARES.
F II-2 MICROFALIA Y OTRAS DISMORFIAS

Genealogía. Caso 2.

Figura 1: Genealogía de los 3 casos.

coartación de la aorta y drenaje venoso anómalo pulmonar) y ausencia bilateral de lobulaciones pulmonares. El estudio cromosómico con bandeado GTG (bandeo G con Tripsina y Giemsa) en cultivo del linfocitos periféricos reveló un cariotipo 46, XY, -15, +t(15 pl? 22 pl?) (Fig. 3 A).

El estudio cromosómico de ambos padres y de la hermana con RM fue normal.

Caso 2: FN 6/8/81. Hija de padres sanos, no consanguíneos, producto de un primer embarazo, no deseado, y en el cual mediaron maniobras abortivas. Parto de término con PN 2.830 gr, T 48 cm y CC 32 cm. Por historia de retraso de desarrollo psicomotor (RDPM) y dismorfias fue referida para evaluación genética a los 2,5 años de edad. La historia familiar demostró la existencia de displasia de caderas en la familia de su abuela materna; un gran número de abortos espontáneos y un niño con retardo mental (RM) y malformaciones en la familia del abuelo materno (Fig. 1). El examen físico demostró retraso del crecimiento (P 12 kg, T 83,6 cm, CC 46,6 cm), fosetas y papilomas preauriculares bila-

terales, columela achatada, paladar hendido reparado, luxación de caderas (Fig. 2-DE). En las manos había pliegues de flexión supernumerarios en las falanges medias de ambos índices y alteración de los surcos palmares de flexión. El estudio cromosómico de la probando demostró una trisomía 22 parcial. El cariograma de su padre fue normal (46,XY) y el de su madre reveló una translocación balanceada (11;22) (Figs. 3-C y 4), por lo que el cariotipo de la probando corresponde a: 47, XX, + der(22), t(11;22) (q25;q13) mat (Fig. 3-B). El estudio cromosómico de la familia demostró que el abuelo materno y 3 de los 4 hermanos de la madre son portadores de la translocación, con cariotipos 46, XX ó XY, t(11;22) (11pter → 11q25::22q13 → 22qter), + (22pter → 22q13).

Caso 3: FN 7/2/84 (Historia Nº 372127, Hospital Regional de Temuco). RN de sexo masculino, hijo de padres sanos, no consanguíneos, aparentemente sin antecedentes hereditarios familiares. Padre 45 años, madre 42 años y 3 hermanos aparentemente sanos. Producto de embarazo que

Figura 2: Fotografías de los probandos mostrando algunas de sus anomalías

Figura 3: Alteraciones cromosómicas encontradas en los casos.

- Caso 1: 46,XY, -15, +t(15p1? 22p1?)
- Caso 2: 47,XX, +der(22), t(11;22) (q25;q13) mat.
- Madre Caso 2: 46,XX, -11, -22, +t(11pter → 11q25::22q13 → 22qter) + 22pter → 22q13::11q25 → 11qter)
- Caso 3: 47,XY, +der(22), t(11;22) (q25;q13) mat.
- Madre Caso 3: 46,XX, -11, -22, +t(11pter → 11q25::22q13 → 22qter) + (22pter → 22q13::11q25 → 11qter)

só con hipertensión arterial y hemorragia del tercer trimestre. Parto de término por cesárea. 2.150 gr (PEG), T 49 cm, CC 32 cm, Apgar 8 9 al 1' y 5', respectivamente. En el examen neonatal inmediato se constató imperforación de la boca, facie especial por micrognatismo y prognatismo, deformación de los pabellones auriculares; nariz y ojos algo prominentes, fílum alargado, paladar hendido, criptorquidea y hernias inguinales bilaterales. A las 18 horas de vida se realizó anoplastia perianal (Colgajo de Leclercq). El estudio cromosómico con bandeado Q demostró una trisomía 22 parcial. Su evaluación a

Figura 4: Cariotipo de la madre del Caso 2.

los 8 meses de edad demostró retraso global del crecimiento (P 6.000 gr., CC 40 cm) y del desarrollo psicomotor (CD 0.38)¹¹ y leve variación de sus estigmas físicos (fig. 2-F, G, H). El estudio cromosómico con bandeado GTG demostró cariotipo 48,XX, + der(22), t(11;22) (q25;q13) mat. en el probando, (Fig. 3-D) normalidad en su padre y translocación balanceada (11;22) (q25;q13) en la madre. (Fig. 3-E).

DISCUSION

Establecer una correlación definida entre características fenotípicas y alteraciones del cromosoma 22 ha sido muy difícil por las limitaciones de las técnicas citogenéticas en uso¹² y la heterogeneidad de las alteraciones encontradas¹³. Sin embargo, a pesar de que tanto el SOG como las trisomías 22 parcial y total comparten ciertas características clínicas¹³, hay algunos elementos que orientarían a diagnósticos específicos (Tabla 1)^{3, 6, 13, 14}.

De los casos presentados (Tabla 2), dos corresponden a trisomía 22 parcial y en otro es total.

Ninguno de los casos presenta el marcador dicéntrico que se requeriría para definir citogenéticamente el SOG^{3,14}. El Caso 1 demuestra que sujetos con la trisomía 22 total pueden llegar a nacer y no sólo presentarse en abortos espontáneos como ha sido sugerido^{6,9}. Las malformaciones pulmonares encontradas en la autopsia de este paciente no han sido aparentemente descritas. El hallazgo de una trisomía 22 total por

translocación, junto al antecedente de una hermana con RM de causa no precisada, sugirieron la posibilidad de un rearrreglo cromosómico familiar. Sin embargo el estudio citogenético de esta familia fue normal, demostrando que el rearrreglo del probando sucedió "de novo".

La trisomía 22 parcial encontrada en los Casos 2 y 3 constituye una de las anomalías más frecuentes del cromosoma 22. Esto se explica

Tabla 1.

Características Clínicas y Citogenéticas de los Síndromes Asociados a Trisomía 22

	Síndrome de Ojo de Gato	Trisomía Parcial	Trisomía Total
CLÍNICA			
Coloboma del Iris	+++	±	±
Atresia Anal	+++	±	±
Fosetas y/o Papilomas preauriculares	+	+++	+++
Cardiopatía Congénita	±	+	+++
Facie Típica	-	++	+++
R.M.	- A +	++	+++
Pronóstico Vital	Bueno	Bueno	Malo
CITOGENÉTICA	Marcador Bisatelitado (dup 22pter---22q11)	Trisomía 22 parcial	Trisomía 22 total

Tabla 2.

Resumen de las Principales Características Clínicas y Citogenéticas de los 3 probandos

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
CLÍNICA			
Coloboma del Iris	Sí	No	No
Imperforación Anal	Sí	No	Si
Fosetas y/o Papilomas Preauriculares	Sí	Sí	No
Cardiopatía Congénita	Sí	No	?
Microftalmia	Sí	No	No
Figura Palatina	No	Sí	Sí
Retraso Mental	?	Sí	Sí
Pronóstico	Fallecido PRN	Vivo	Vivo
CARIOTIPO	46,XY,-15,+t(15;22)	47,XX,+del(22)(q13)	47,XY,+del(22)(q13)

porque la $t(11;22)$, que da origen a estos casos, es una de las más frecuentes en estudios cromosómicos en la población general^{8,15}.

La mayoría de las familias descritas con $t(11;22)$ tienen idénticos puntos de rotura sugiriendo la existencia de sitios débiles prontos a romperse^{8,15}. El intercambio preferencial de segmentos cromosómicos entre los cromosomas 11 y 22 ha sido atribuido a una eventual mayor proximidad de estos cromosomas en la meiosis^{15,16}. En los portadores de esta translocación, el apareamiento de los cromosomas 11 y 22 durante el paquíteno de la meiosis produce una figura cuadrirradial muy asimétrica (Fig. 5). Esto, sumado al hecho que no se forma quiasma en los segmentos intercambiados muy cortos¹⁷, favorece la no disyunción del derivativo 22, el cual puede migrar a cualquiera de los dos polos del ecuador, produciéndose así una segregación 3:1 que explica el $22q^{-}$ encontrado en los probandos 2 y 3. Esta trisomía terciaria, en que hay un complemento normal más un cromosoma derivativo, fue de origen materno en las dos familias estudiadas. Se ha visto que de las diferentes probabilidades de segregación, 4 de 12 producirían productos viables y 8 de 12 contribuirían a la producción de abortos espontáneos¹⁵. Esto es concordante con los riesgos de recurrencia observados empíricamente en familias con esta translocación recíproca. Zackai y cols.¹⁵ han establecido que, cuando el hombre es el portador, se produce un 48% de abortos espontáneos y un riesgo de 77,8% de tener hijos portadores, no dándose casos de hijos con trisomía. Esto es concordante con lo observado en la familia del Caso 2 (Fig. 1) en que 4 de los 5 hijos de F III - 10 (80%) presentan la translocación y no hubo hijos afectados. Por otra parte, cuando la mujer es la portadora, se ha descrito 30% de de abortos espontáneos, 68% de hijos portadores y 4,3 a 10% de hijos con el $der(22)$ extra. Esto se observó en nuestros Casos 2 y 3 en que los afectados son hijos de mujeres portadoras. Los abuelos maternos de la última familia (Caso 3) aún no han sido estudiados. Recientemente (Abril 1985) la hermana mayor del último probando (Fig. 1, Caso 3, F II 2) dio a luz a una hija (F III - 2) con malformaciones en los pabellones auriculares, facie especial y otras dismorfias similares al propósito. Este acontecimiento permitió al equipo médico informarse de que otro de los hermanos (F II 3) también tenía malformaciones craneo-faciales que no habían sido reportadas por su madre. A pesar de la urgencia con que se realizó el estudio citogenético en los padres del probando, con la finalidad de poder ofrecer —en caso necesario— diagnóstico prenatal a su hija mayor, quien cursaba embarazo del

Figura 5: Configuración cuadrirradial asimétrica producida en el paquíteno como consecuencia de la translocación 11/22 y los posibles segregantes.

primer trimestre, la madre no informó al resto de la familia de su condición de portadora y del posible mayor riesgo de malformaciones en esta familia. El estudio citogenético de todos los familiares se completará en los próximos meses.

Los casos presentados enfatizan la necesidad de realizar estudios cromosómicos, con técnicas de bandedo, a todo RN con malformaciones congénitas sugerentes de éstas u otras afecciones cromosómicas. Cuando se detecta una alteración cromosómica estructural deben investigarse ambos padres, y si alguno de ellos presenta una translocación balanceada, debiera realizarse el estudio citogenético a todos los descendientes. Esto permitirá otorgar consejo genético informando riesgos de recurrencia reales y ofrecer la posibilidad de diagnóstico prenatal en caso necesario.

RESUMEN

En los últimos años se han delineado tres entidades que involucran trisomía del cromosoma 22 y que comparten ciertas manifestaciones clínicas: el síndrome de ojo de gato, la trisomía parcial y la trisomía total 22, cuya existencia en recién nacidos aún está en controversia.

Se describe un caso de trisomía 22 total, por translocación (15;22) "de novo", que falleció en el período de recién nacido con malformaciones pulmonares no descritas, y dos pacientes con una trisomía 22 parcial, (47, XX y XY, + $der(22)$, $t(11;22)$ (q25;q13) mat) debida a una segregación 3:1 en sus madres, quienes son portadoras

de una translocación balanceada (11;22).

Se discuten los hallazgos clínicos y citogenéticos de los probandos y sus familiares, así como los riesgos de recurrencia de estas trisomías.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Dr. Jorge Las Heras por la realización del estudio anatómico patológico del Caso 1; a las Dras. Angélica Montesinos, Lidia Benítez y Sra. Edith Urrutia del Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Temuco por la colaboración en el estudio del 3er. Caso. Al Dr. Albert Schinzel del Institute of Medical Genetics University of Zurich por su comentario y referencias.

REFERENCIAS

- Schachentmann, G., Schmid, W., Fraccaro, M., Mannini, A., Tiepolo, L., Perona, G.P., Sartori, E.: Chromosomes in coloboma and anal atresia. *Lancet* 2: 290, 1965.
- Gerald, P., Davis, C., Say, B., Wilkins, J.: A novel chromosomal basis for imperforate anus (The "Cat's Eye Syndrome"). *Pediatr. Res.* 2: 297, 1968.
- Schinzel, A., Schmid, W., Fraccaro, M., Tiepolo, L., Zuffardi, O., Opitz, J.M., Lindsten, P., Zetterqvist, P., Enell, H., Baccichetti, C., Tencioni, R., Pagon, A.R.: The "Cat Eye Syndrome": Dicentric Small Marker Chromosome probably derived from a No 22 (Tetrasomy 22pter--q11) Associated with a Characteristic Phenotype. *Hum. Genet.* 57: 148, 1981.
- Hsu, L., Shapiro, L., Gertner, M., Lieber, E., Hirschhorn, K.: Trisomy 22: A clinical entity. *J. Pediatr.* 79: 12, 1971.
- Toomey, K., Leisti, M., Szalay, G., Kaback, M.: Further Pediatr., delineation of the supernumerary chromosome in the Cat Eye Syndrome. *Clin. Genet.* 12: 275, 1977.
- Garlinger, P., McGeary, S., Magenis, E.: Partial trisomy 22: A recognizable syndrome. *Clin. Genet.* 12: 9, 1977.
- Bofinger, M.K., Soukup, S.: Cat Eye Syndrome. Partial trisomy 22 due to translocation in the mother. *Am. J. Dis. Child.* 131: 893, 1977.
- Schinzel, A., Schmid, W., Auf der Maur, P., Moser, H., Degenhardt, K.H., Geisler, M., Grubisic, A.: Incomplete trisomy 22. I. Familial 11/22 translocation with 3:1 meiotic disjunction. *Hum. Genet.* 56: 249, 1981.
- Schinzel, A.: Incomplete Trisomy 22. III Mosaic-Trisomy 22 and the problem of full trisomy 22. *Hum. Genet.* 56: 269, 1981.
- Schinzel, A.: Incomplete Trisomy 22. II Familial trisomy of the distal segment of chromosome 22q in two brothers from a mother with a translocation, t(6;22)(q27;q13). *Hum. Genet.* 56: 263, 1981.
- Rodríguez, S., Arancibia, V., Undurraga, C.: Escala de evaluación del desarrollo psicomotor: 0-24 meses. SNS Segunda edición revisada, Santiago, 1976.
- Reiss, J., Weleber, R., Brown, M., Bangs, Ch., Lovrien, E., Magenis, E.: Tandem duplication of proximal 22q: A cause of Cat-Eye Syndrome. *Am. J. Med. Genet.* 20: 165, 1985.
- Rosenfeld, W., Verma, R., Ihaveri, R.: Cat Eye Syndrome with unusual marker chromosome probably not chromosome 22. *Am. J. Med. Genet.* 18: 19, 1984.
- Schinzel, A.: Catalogue of unbalanced chromosome aberrations in man. Walter de Gruyter, Berlin, 1983.
- Zackai, E., Emanuel, B.: Site-specific reciprocal translocation. t(11;22)(q23;q11), in several unrelated families with 3:1 meiotic disjunction. *Am. J. Med. Genet.* 7: 507, 1980.
- Valenzuela, C.Y.: Comunicación personal (1984).
- Lindenbaum, R.H., Bobrow, M.: Reciprocal translocations in man. 3:1 meiotic disjunction resulting in 47 or 45 chromosome offspring. *J. Med. Genet.* 12: 29, 1975.